

Aus der Universitäts-Frauenklinik Bonn.

Direktor: Professor Dr. Siebke.

Erfahrungen mit dem Kurznarkotikum Evipan-Natrium.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doktorwürde

der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

zu Bonn.

Vorgelegt am 21. Oktober 1936

von

Julius Rempe,

approbierter Arzt

aus Bonn am Rhein.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Bonn.

Referent: Doz. Dr. Rupp.

Korreferent: Professor Dr. Siebke.



Erfahrungen mit Evipan-Natrium.

Evipan-Natrium, ein weißes, kristallinisches, geschmackfreies Pulver, ist chemisch ein in Wasser leicht und klar lösliches Natrium-Salz des N-Methylcyclohexenylmethylmalonylureids, also wie die meisten intravenösen Kurznarkotika ein Barbitursäureabkömmling. Auf physiologisch-chemische oder pharmakologische Eigenschaften näher einzugehen, erübrigt sich nach den umfangreichen und erschöpfenden Veröffentlichungen von Weese, Castro, Storm, Fuge, Anschütz u. a., die teilweise auch im Tierversuch die Ungefährlichkeit des Mittels bei entsprechender Dosierung nachgewiesen haben. So untersuchte Weese die Evipan-Wirkungen an der Katze, Storm am Affen. Castros eingehende Untersuchungen ergaben, daß bei langsamer Evipan-Injektion von 15 Sc/ccm ernsthafte Veränderungen des Blutzuckers, des Harnstoff-, Milchsäure-, Kreatininspiegels und der Alkalireserve nicht eintraten. Etwaige geringe Änderungen schlugen nach der positiven Seite aus, was für Evipan spricht. So wurde die Alkalireserve nicht vermindert, der Blutzucker nicht erhöht. Fuge untersuchte die Beeinflussung des Estercholesterins durch Evipan und kommt im Verlaufe seiner Untersuchungen zu dem Schluß, daß die Leber bei den kurzen Evipan-Narkosen keine Schädigung zu erleiden scheint. Anschütz stellt fest, daß die Narkose-Breite des Evipans sehr günstig ist (therapeutische Breite des Evipan-Natriums beträgt 3,3—4) und mehr als doppelt so groß wie die des Äthers ist.

Die ersten Versuche mit Evipan-Natrium reichen an der Universitäts-Frauenklinik in Bonn bis Juli 1932 zurück. Bis Juli 1934 wurden insgesamt 1200 Narkosen ausgeführt und kontrolliert. Nach den guten Erfahrungen bei diesen Narkosen werden mindestens über 1000 Evipan-Natrium-Narkosen durchschnittlich im Jahr an der Universitäts-Frauenklinik in Bonn ausgeführt, so daß wir jetzt über ein Material von annähernd 4000 Evipan-Natrium-Narkosen verfügen. Bei den ersten 500 Narkosen, welche Anzahl

Ende März 1933 erreicht war, wurde bei jeder Narkose ein ausführlicher Narkosebericht von mir verfaßt, der Notizen über die Art des Eingriffs, die Dosierung, den Narkoseeintritt, die Dauer der Narkose und ihre Tiefe, sowie über jegliche Zufälle oder Besonderheiten enthielt.

An Operationen kamen folgende 1200 in Evipan-Natrium-Narkose in der Zeit von Juli 1932 bis Juli 1934 zur Ausführung:

Abrasio	344
Abrasio und Probeexcision	98
Abrasio und Polypenentfernung	10
Abrasio und digitale Austastungen	77
Abrasio und Schröder-Emmet	32
Abrasio und Laparotomie (Uterusperfor.)	1
Abrasio und Bartholinitis	1
Abrasio und Verschorfung	1
Abrasio und Hymenexzision	1
Abrasio, digitale Austastung und Probeexzision	2
Abrasio und Ulcusexzision am Introitus	1
Abrasio, Probeexzision und Radiumeinl.	5
Abrasio und Radiumeinlage	24
Abrasio und Entfernung eines präperitonealen Lipoms	1
Abrasio, Radiumeinlage und Cystoskopie	1
Abszeßspaltung	2
Adenomentfernung aus einer Labie	1
Abdom. Totalexstirpation	1
Cystoskopie	4
Cystoskopie u. Kauterisation in der Blase	2
Condylomentfernung mit Diathermie	1
Cystoskopie und Radiumeinlage	1
Bogenschnitt bei Mastitis	1
Dilatation und Fehling	2
Digitale Austastung	2
Digitale Austastung und Laminariaeinlage	1
Douglaseröffnung	2
Exzision und Inzision bei Bartholinitis	4
Exzision eines Ulcus der großen Labie	1
Entfernung einer Schamlippe	1

Entfernung einer Scheidencyste	I
Fadenentfernung	I
Hämorrhoidalknotenentfernung	2
Hyperemesis gravidarum	I
Interruptio	3
Interruptio und parametrane Anästhesie	2
Kauterisation von Inguinaldrüsen	I
Kauterisation der Portio	4
Kauterisation bei Vulva-Ca	I
Laminaria	19
Maßtitispaltung	33
Narkoseuntersuchung (1mal Tbc.)	121
Narbenbruchoperation (Appendektomienarbe)	I
Pessareinlage	7
Probeexzision	16
Probeexzision aus der kleinen Labie	4
Probeexzision und Radiumeinlage	7
Probeexzision und Scheidenerweiterung	I
Perturbation und Difficlion	I
Polypenentfernung	I
Radiumeinlage	261
Sekundäre Naht	I
Supravaginale Corpusamp. und Entfernung der rechten Adnexe, vordere und hintere Plastik	I
Spaltung eines periproktischen Abszesses	I
Tamponade	I
Tamponadenentfernung	I
Tubarruptur (Laparotomie)	I
Tubenunterbindung und Antefixation (Tbc.)	I
Uterusaufrichtung	I
Vulvaexstirpation	I
Vordere u. hintere Plastik u. Portioamputation	I
Vordere und hintere Plastik (plus Pudendus- anästhesie)	I

Evipan in der Geburtshilfe

I. vor erfolgter Geburt

a) bei erwarteter Lebendgeburt

Episiotomie	15
-----------------------	----

Extraktion	2
Sectio extraperitonealis	3
Spontangeburt	1
Zangen	5
b) bei erwarteter Totgeburt	
Kombinierte Wendung	1
Perforationen	3
2. nach erfolgter Geburt	
Cervixrißnaht	2
Dammnaht 1. ^o	20
Dammnaht 2. ^o	15
Dammnaht 3. ^o	2
Manuelle Plazentalöfung	2
Nachtaftung	1
Scheidenrißnaht	1
Summa	1200

Die Annehmlichkeit der Narkose bestand zunächst einmal darin, daß eine medikamentöse Vorbereitung vollkommen überflüssig war, ebenso war ein Nüchternbleiben der Patienten keineswegs erforderlich, jedoch achteten wir darauf, daß die Patienten nicht gerade mit vollem Magen zur Operation kamen. Wir wandten die Evipan-Narkose bei sämtlichen uns hierfür geeignet erscheinenden Fällen an. Bei der Art der Eingriffe hielten wir jedoch im allgemeinen nur solche Operationen für eine Evipan-Narkose geeignet, die zu ihrer Beendigung nicht mehr als 15 bis höchstens 30 Minuten erforderten. Wir beschränkten uns also im Gegensatz zu vielen anderen auf eine Evipan-Kurz-Narkose und die Evipan-Äther-Zusatznarkose, die wir in der Regel nur dann anwendeten, wenn die verabfolgte Evipan-Dosis zur schmerzlosen Beendigung des Eingriffs nicht ausreichte. D. h., wir setzten in einigen wenigen Fällen dann Äther zu. Einige Male versuchten wir auch eine Evipan-Basis-Narkose, die man jedoch besser als Evipan-Start-Narkose bezeichnet. A n f c h ü t z sagt nämlich, Evipan ist pharmakologisch kein gutes Basis-Narkotikum, wohl ein sehr schnell wirkendes Einschlafmittel, daher kann man nur von einer Startnarkose sprechen. Der große Vorteil des Evipans besteht in seinem schnellen Anfluten, bei dem in 3 bis 5

Minuten das zweite Toleranzstadium erreicht ist und nach einer Dauer von 5 bis 8 Minuten die Narkose innerhalb von 5 bis 10 Minuten zum halben Wachsein abflutet. Daher ist, wie auch Holtermann nachgewiesen hat, bei Evipan die Bezeichnung Basis-Narkose unzutreffend, da Evipan vom Körper zu schnell ausgeschieden wird, also nicht, wie z. B. das Avertin eine Narkosebasis schafft, sondern nur als Sprungbrett benutzt werden kann, um den Patienten unmerklich von der Evipan-Narkose in die Äthernarkose überzuführen. Daß Evipan nicht als Basis-Narkotikum bezeichnet werden kann, hat außerdem Weese pharmakologisch nachgewiesen.

Durch diese beschränkte Art der Anwendung des Evipans erzielten wir ein sehr geringes Gefahrenmoment, da hierbei größere Evipan-Dosen in der Regel überhaupt nicht zur Anwendung kommen. Wir gaben das Mittel bei Patienten jeglichen Alters, wobei wir naturgemäß bei der Art unserer Klinik, Erfahrungen bei Kindern oder männlichen Patienten nicht sammeln konnten. Mit einigen wenigen Ausnahmen, auf die ich später noch zu sprechen komme, beschränkten wir die Anwendung der Evipan-Narkose nur auf sonst organegesunde Patienten.

Die Herstellung der Evipan-Lösung geschah durch Auflösung von einem Gramm Evipan-Natriumpulver in 10 ccm sterilem Aqua dest. unter mehrmaligem Hin- und Herspritzen, um eine gleichmäßige Verteilung und Auflösung des Evipan-Natriums in der Spritze zu erzielen. Bei nicht einwandfreier völliger Lösung sahen wir öfters Zuckungen und Unruhe auftreten. Evtl. empfiehlt sich nach dem Vorschlag von Stamm ein Anwärmen der Injektionslösung auf Körperwärme, da hierdurch die Neigung zu prä- oder postoperativen Erregungen verschwinden soll. Auch wir haben wie mehrere andere die Erfahrung gemacht, daß das an Stelle des Evipan-Natrium-Pulvers einige Zeit von der I.G. gelieferte Evipan-Natrium-Konzentrat, das inzwischen aus dem Handel gezogen ist, von schlechterer Wirkung als das Pulver ist, und leichter zu Erregungszuständen und unangenehmen Nachwirkungen führt.

Wir empfehlen dringend die langsame Injektion bei elastisch-individueller Dosierung auf biologischer Grundlage (Baetzner, Holtermann), weil man meiner Meinung nach nur so vor einer initialen zu starken Anschoppung im Blut und einer Über-

dosierung mit ihren Folgen, wie plötzlicher Atemlähmung oder Herz- und Kreislaufstörungen, bewahrt werden kann. Diese Erfahrung wird beim Studium der Literatur bestätigt (Eisch, Gocke, Stimpfl u. a.), die Zwischen- und Todesfälle bei Evipan-Narkosen beruhen fast alle auf Fehlern, die dieser These widersprechen. Im Tierexperiment hat dies außerdem Storm eindeutig bei Affen bewiesen, wo im Gegensatz zu der langsamen Injektion bei zu schneller Injektion Blutdruck und Atemfrequenz rasch absanken, so daß bei rascher Injektion großer Dosen der Tod eintreten kann. Weiter brachte er durch Anwendung einer großen Evipan-Dosis das isolierte Affenherz zum Stillstand, worauf die Herztätigkeit nach kurzer Pause wieder einsetzte, als ob das Herz nur eine kurze Ruhepause gehabt hätte. Weese hat im Tierexperiment an der Katze schlagartigen Atemstillstand bei akuter Überdosierung erzielt. Dies beweist ebenfalls für den Kliniker die Gefahr einer plötzlichen und raschen Anschoppung von Evipan im Blut, wie sie die schnelle Injektion hervorruft. — Wir spritzen den ccm der 10%igen Evipan-Natriumlösung durchschnittlich in 15 bis 20 Sec. ein. Unsere guten Erfahrungen mit dieser Methode werden durch die gleichen guten Erfahrungen und Resultate zahlreicher Autoren bestätigt. Außerdem bemerkten wir bei zu schneller Injektion ein vermehrtes Auftreten von Zuckungen und Unruhe während und nach der Narkose, vielleicht beruht auch ein Teil der hin und wieder beobachteten postoperativen Erregungszustände hierauf. Evtl. werden hierdurch die von Schumacher und Adler bei ihren Versuchen beobachteten, verhältnismäßig häufigen schweren Erregungszustände sowohl beim Einschlafen als auch beim Erwachen erklärt, ebenso auch ein Fall von vorübergehendem Atemstillstand bei Beginn des Einschlafens — also während der Injektion. Sie spritzen aber nach eigenen Angaben den ccm in 10 Sec., also zu schnell. Die gleiche Beobachtung machte Stefan an der Psychiatrischen und Nervenlinik in Jena, der erwähnt, daß es bei rascher intravenöser Injektion von Evipan-Natrium zu zerebralen Reizsymptomen, wie klonischen Zuckungen in der Extremitätenmuskulatur, flüchtigen Pyramiden symptomen, Senkung des Blutdrucks, Pulsarrhythmie und schlaffer Lähmung kommt. Die Ursache sei lediglich allzu rasche Injektion. Reizlos sei eine Injektion von 3 ccm/Min., maximal eine von 10 ccm/

2 Min. Das wären also 12 bis 20 Sec./ccm. — Die Mehrzahl der Berichterstatter spritzt die Evipan-Lösung in einer Geschwindigkeit von 10 bis 15 Sec./ccm, hiervon empfiehlt ein Teil bis zum Eintritt der Wirkung mit 15 Sec./ccm zu spritzen und dann den Rest in etwa 10 bis 12 Sec./ccm weiterzuspritzen. Obwohl wir an unserer Klinik bei versuchsweiser Anwendung dieser Methode keine Komplikationen erlebt haben, möchte ich dieses Verfahren jedoch wegen der damit verbundenen Gefahr ablehnen, und dringend raten, sich an eine Injektionsgeschwindigkeit von 15 bis 20 Sec./ccm zu halten, ob man dann die Injektionsgeschwindigkeit staffelt, ist ja gleichgültig. Noch vorsichtiger als wir geht Baetzner vor, der mit einer Geschwindigkeit von 25 bis 30 Sec./ccm injiziert und dann nach dem ersten tiefen Schlaf noch eine Injektionspause von 1 bis 1½ Min. macht. Er verfügt dabei über Erfahrungen bei 2000 Narkosen ohne Zwischenfälle. Am vorsichtigsten geht Decker vor, der in zwei Min./ccm injiziert, wobei, wie er sagt, manchmal 15 Min. bis zum Eintritt völliger Schmerzlosigkeit verstreichen können. Diese beiden Methoden möchte ich jedoch als zu vorsichtig ablehnen, besonders in Anbetracht der zahlreichen guten Erfolge an unserer und anderen Kliniken mit einer bedeutend schnelleren, aber doch immerhin langsamen Injektion.

In Kürze läßt sich also sagen: Für die intravenöse Injektion der 10%igen Evipan-Natrium-Lösung, die stets in die Armvene vorgenommen wurde, benötigten wir eine Zeit von etwa 2 bis 3 Minuten bei einer Injektionsgeschwindigkeit von 15 bis 20 Sec. pro ccm, hierbei injizierten wir die ersten ccm sehr langsam in etwa 20 Sec. pro ccm und erhöhten die Injektionsgeschwindigkeit nur unwesentlich nach Beobachtung des Wirkungseintritts. Bei schnellerer Injektion beobachteten wir sehr häufig tonisch-klonische Zuckungen, leichter oder schwerer Art im Bereich des Gesichts, hin und wieder auch der Extremitäten, die jedoch meist bald verschwanden, sich aber durch eine langsame Injektion in den meisten Fällen vermeiden ließen.

Da wir an unserer Klinik schon sehr früh (Juli 32) die ersten Versuche mit der Evipan-Natrium-Narkose machten, waren wir bei der Dosierung zunächst fast völlig auf uns angewiesen, d. h. wir spritzten bis zu 15 ccm 10%ige Evipan-Natrium-Lösung — zu unserem Glück — ohne nachweisbare Schädigung der Patienten.

Da wir hierbei äußerst lange Narkosen mit Nachschlaf bis zu 17 Stunden erzielten, gingen wir stetig mit der Dosis herunter, zumal wir Evipan gleich bei unseren Vorversuchen nur zu kleinen, operativen Eingriffen wie Abrasionen etc. benutzten. Die ersten Eindrücke waren beängstigend und es föhnte einen wie Sellheim so treffend sagt, nur das harmlose Vorübergehen der Evipan-Narkose mit dem erschreckenden, totenähnlichen Schlaf aus. Wir stellten dann fest, daß die Patienten je nach Alter, Konstitution, Kondition etc. grundverschieden auf das Evipan reagieren. Es zeigten adipöse Patienten ein anderes Verhalten als magere, aufgeregte als ruhige, schwache anders als kräftige, junge wieder anders als alte Patienten usw. Diese einzelnen Kategorien aber reagierten auch unter sich wieder ganz verschieden. Kurzum, die Patienten reagierten individuell verschieden. Daher kam für uns eine Dosierung des Evipans nach dem Gewicht der Patienten schon gleich zu Anfang überhaupt nicht in Frage. Man konnte wohl sagen, daß im allgemeinen eine asthenische, lebhaftere, durch die bevorstehende Operation aufgeregte Patientin mehr Evipan zum Einschlafen benötigte, als eine robuste, etwas adipöse, besonnene oder etwas indolente Patientin, wie dies K ö f t e r unter anderen auch beobachtete. Diese Beobachtung schließt aber schon eine Narkosedosierung nach dem Gewicht aus, auch wenn man Faktoren, wie Narkoseeignung bzw. Nichteignung — die ja weitgehend subjektiv sind — sowie das Alter mit in Anwendung bringt. Jedes Narkoseschema (K ö f t e r , A n s c h ü t z , S p e c h t) muß bei der Evipan-Narkose schroff abgelehnt werden, da es den mit der Narkose noch nicht Vertrauten in Sicherheit wiegt, in Wirklichkeit aber in Gefahr bringt. Ein Schema kann höchstens als Anhalt dem Anfänger dienen. Der einzig mögliche Weg war der, die Narkose elastisch individuell auf biologischer Grundlage zu dosieren, wie dies H o l t e r m a n n ausgedrückt hat. Den einzigsten Anhaltspunkt hierfür glaubten wir in dem Zeitpunkt des Einschlafens erkennen zu können, denn dieser war bei jedem Patienten individuell verschieden. Wir gingen nun bei der Dosierung so vor, daß wir uns streng nach der Anzahl der ccm richteten, die zum Einschlafen der Patienten genügten, was meist bei drei bis fünf ccm der Fall war. Dieser Zeitpunkt war außerdem sehr leicht zu bestimmen, da bei der intravenösen langsamen Injektion die Narkose fast stets unter einem tiefen Atemzug

bzw. unter einem Seufzer oder deutlichem Gähnen sowie folgendem Kieferrückfall eintrat. Wir spritzten dann noch weitere 2 bis 3 ccm ein (in einigen wenigen Fällen bis zu 5 ccm), wobei wir jedoch vollkommen individuell vorgingen und uns nach dem Kräftezustand und der Körperverfassung der Patienten richteten. Bei jungen und kräftigen Patienten konnten wir meist etwas mehr Evipan als bei älteren kachektischen oder sonst geschädigten Patienten ohne Zwischenfälle injizieren. Wir kamen aber meist mit 6 bis 8 ccm Evipan-Natriumlösung aus, um eine gute tiefe Narkose für 15 bis 20 Minuten zu erzielen. Eine allzu große Ängstlichkeit in der Dosierung vermieden wir, da wir, wie bereits erwähnt, bei unseren Vorversuchen ohne jegliche nachweisbaren Schädigungen, Injektionsmengen bis zu 15 ccm verwendet hatten, wobei als einziger Nachteil sich ein über mehrere Stunden erstreckender tiefer Nachschlaf einstellte. Bei der Bestimmung der nach dem Einschlafen noch erforderlichen Evipan-Natriummenge richteten wir uns naturgemäß auch etwas nach der Dauer des zu erwartenden Eingriffs. Man muß aber die Patienten während der ganzen Dauer der Injektion scharf beobachten und ist so bei langsamer Injektion in der Lage, die Einspritzung bei den geringsten Anzeichen einer ernstesten Komplikation sofort abubrechen. Das Tastende der Dosierung möchte ich mit dem so widerspruchsvoll klingenden Satz ausdrücken: Man gebe so wenig Evipan wie möglich, jedoch nicht weniger als nötig, aber auch so viel wie nötig und nicht weniger als möglich.

Dies ist aber bei vergleichendem Studium der gesamten Evipan-Literatur auch gleichzeitig mit die vorsichtigste Art der Dosierung und Technik. Ich nehme fest an, daß dies die Gründe sind, weshalb wir an der Universitäts-Frauenklinik in Bonn nicht einen einzigen ernstesten Zwischenfall erlebt haben, für den das Evipan verantwortlich zu machen ist, und zwar nicht nur bei den 1200 von mir zitierten Fällen, sondern auch bei den inzwischen weiter ausgeführten Narkosen, die wohl jetzt insgesamt 4000 betragen werden.

Weiter ist während der Narkose sorgsam auf die Kieferstellung und das Nachvornbringen des Kiefers zu achten, um unliebsame Zwischenfälle zu vermeiden. Die Annehmlichkeit der Narkose verführt nämlich geradezu, den Kiefer und Patienten sich selbst zu überlassen. Einerseits aber sinkt der Kiefer, wie bei jeder Narkose

zurück, andererseits tritt sehr leicht zu Beginn der Narkose oder kurz vor dem Erwachen eine Art Kieferkrampf bei der Evipan-Narkose auf, wodurch die Patienten ernstlich gefährdet werden, falls der Kiefer nicht ordnungsgemäß gehalten wird. Einen derartigen Zustand erlebten wir nämlich einmal bei der Ausführung einer Damrnaht. Sicher geworden durch den harmlosen Verlauf zahlreicher Narkosen waren wir dazu übergegangen, die Patienten während der größten Zeit der Narkose sich selbst zu überlassen. Plötzlich wurde die Patientin zyanotisch, es kam zu stark behinderter, gurgelnder Inspiration als deren Ursache ein Zurücksinken des Kiefers festgestellt wurde. Infolge eines krampfhaften Zustandes der Gesichtsbzw. Kiefermuskulatur gelang es nur sehr schwer und nach längeren, zunächst vergeblichen Bemühungen, den Kiefer wieder nach vorne zu bringen und so die Behinderung der Atmung zu beseitigen. Ich habe mich eigentlich gewundert, daß etwas Ähnliches in der Evipan-Literatur bisher noch nirgendwo erwähnt wurde, beobachteten wir doch später noch öfters Kramp fzustände an der Kiefermuskulatur, die aber weiter ohne Folgen blieben, da seither an unserer Klinik der Kiefer während der ganzen Dauer der Narkose gehalten wird. Es handelte sich hierbei wohl gernerkt nicht um einen Glottiskrampf der nach B a e t z n e r in England für die Evipan-Todesfälle bei Halsphlegmonen etc. verantwortlich gemacht wird. Vielleicht können so die von B o d e n erwähnten vier schweren Asphyxien bei Mundbodenphlegmone Parulis oder alter Tracheotomienarbe, unter denen sich sogar ein Todesfall befand, erklärt werden. Vielleicht werden hierdurch der als Gegenmittel empfohlene Lagewechsel, Trachealkatheterismus) sowie die Tracheotomie entbehrlich, denn einen Glottiskrampf von derartig bedrohlichem Ausmaß haben wir bei unserer langsamen Injektion und vorsichtigen Dosierung nie gesehen. Der Einzige, der im Schrifttum auf das Halten des Kiefers hinweist, ist M e d e r, K ö h l e r erwähnt einmal Trismus, es wäre interessant festzustellen, ob sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Leider läßt es sich nicht mehr feststellen, ob es sich bei dem von mir soeben angeführten Fall um die Verwendung von Evipan in Pulverform oder Konzentrat als Ausgangsmaterial für die Herstellung der Lösung gehandelt hat, denn bei Konzentrat stellten wir ebenso wie A n s c h ü t z eine erhöhte Krampfbereitschaft fest. Diese Komplikation erscheint mir

besonders wichtig für den praktischen Arzt, dem es ja wohl meistens an geeignetem Hilfspersonal für derartige Zwischenfälle fehlen dürfte.

Der normale Verlauf der Evipan-Narkosen ist ein typischer: Nach Injektion von meist nur 3 bis 5 ccm — als kleinste Gabe genügten einmal nur 2 ccm, in einem anderen Fall benötigten wir jedoch 8 ccm — erfolgte, wie bereits erwähnt, Einschlafen unter Vertiefung und vorübergehender Verlangsamung der Atmung, meist begleitet von einem tiefen Seufzen oder Gähnen, dem hin und wieder ein leichtes Zucken im Bereich der Gesichtsmuskulatur oder der Extremitäten folgte. Nach Fortsetzung der Injektion trat Entspannung und Kiefrückfall ein, wobei die meist sehr gute Bauchdeckenentspannung als sehr angenehm empfunden wurde, welche Eigenschaft ja auch fast einmütig im Schrifttum als für den Gynäkologen so überaus angenehme Wirkung des Evipans gelobt und hervorgehoben wird. Schlechte Entspannung der Bauchdecken sahen wir nur zwölfmal bei 500 Fällen, sie ist wohl als Unterdosierung zu erklären. Infolge der guten Bauchdeckenentspannung bei Evipan-Narkose kam es auch zu der relativ häufigen Verwendung der Evipan-Narkose zur Vornahme von Narkose-Untersuchungen (121mal) an unserer Klinik.

Hin und wieder warteten wir zur Vertiefung der Narkose nach Beendigung der Injektion noch 2 bis 3 Minuten, was sich jedoch in den meisten Fällen schon alleine durch die erforderlichen kleineren Operationsvorbereitungen erübrigte. Da die Narkosetiefe zu Anfang und gegen Ende der Narkose am schlechtesten war, ist dieses Warten von 2 bis 3 Minuten vor Inangriffnahme der Operation zur Vertiefung der Narkose ratsam; mußten wir doch sonst gelegentlich die Feststellung machen, daß durch zu frühzeitiges operatives Vorgehen die Patienten künstlich in einer Art Abwehrbereitschaft gehalten wurden. Ebenso erlebten wir ab und zu bei zu lang dauernden Operationen starke Abwehrbewegungen und lautes Schreien der Patientinnen, angenehmerweise bestand hierfür später vollkommene Amnesie. Bei länger dauernden Operationen bewährte sich uns daher eine Ätherzugabe.

Die Dauer der Narkose betrug in der Regel 15 bis 20 Minuten, die Werte schwankten jedoch zwischen 5 und 35 Minuten im Extrem bei reiner Evipan-Narkose ohne Zusatz. Nach dem ersten

Erwachen aus der Narkose stellte sich meist ein Nachschlaf von einer halben bis zwei Stunden ein.

Wir führten die Evipan-Narkose zumeist ohne Vorbereitung mit anderen Medikamenten als Kurznarkose aus und setzten nur in dringenden Fällen, in denen die Narkose zur Beendigung des operativen Eingriffs nicht ausreichte, Äther zu, was bei 1200 Narkosen nur 157mal eintrat. Dies mag vielleicht auch daran liegen, daß wir Evipan-Natrium in der Regel nur für ausgesprochen kurz dauernde Eingriffe verwendeten und uns bei sämtlichen größeren Operationen auf die Avertin-Basis-Narkose beschränkten.

Bei der Ätherzugabe bemerkten wir, daß es zweckmäßig ist, mit dem Zusatz des Inhalations-Narkotikums bereits in der 10. bis 12. Minute der Evipan-Narkose in langsamer, einschleichender Weise zu beginnen, um unnötige Erregungszustände zu vermeiden und unmerklich für den Operateur den Patienten in die Inhalationsnarkose überzuführen.

Die 157 Fälle mit Ätherzusatz lassen sich wie folgt gruppieren: 12mal war die Evipan-Narkose schlecht und 12mal ungenügend, 1mal beobachteten wir einen Versager (Anschütz versteht hierunter eine geringe oder die völlige Unwirksamkeit der üblichen 10 ccm), allerdings bei vollkommen paravenöser Injektion. Nach Abzug dieses letzteren Falles mußten wir also 24mal Äther wegen ungenügender oder schlechter Narkose zusetzen, wir führten also 24mal unfreiwillig eine Ätherzusatznarkose aus. In den übrigen Fällen war entweder das analgetische Stadium oder die Schlafzeit nicht lange genug zur Beendigung des operativen Eingriffs, was naturgemäß einmal an einer kurzen Narkosedauer (unter 10 bis 15 Minuten), andererseits an der zu langen Operationsdauer bei sonst guter Evipan-Narkose lag. Auch hierbei wandten wir die Ätherzusatznarkose an. Die Notwendigkeit solcher Zusatznarkosen beruht natürlich meistens auf einer gewissen Evipan-Unterdosierung und wird sich bei der individuell verschiedenen Reaktion der Patienten auf Evipan und bei der besonderen Eigenart der Dosierung nie ganz vermeiden lassen. Es dürfte hierbei das schnellere oder langsamere Ausscheidungsvermögen und die Höhe des Grundumsatzes eine Rolle spielen, Faktoren, die man bei der Evipan-Injektion in den meisten Fällen nicht voraussehen kann.

Unter den 157 Ätherzusatznarkosen befinden sich jedoch auch einige wenige Fälle, wo wir Evipan als Basis-Narkose bzw. besser Start-Narkose (Anschütz) versuchsweise benutzten. Von der Evipan-Start-Narkose kamen wir aber wieder ab, da wir eine Äthererfparnis mit dieser Methode in nennenswertem Maße nicht erzielten, was von einem Teil der Autoren (Schulz, Ardelst u. a.) bestätigt, von einem anderen aber wieder bestritten wird. Pharmakologisch gesehen ist diese Äthererfparnis, abgesehen von den bei reiner Äthernarkose im Exzitationsstadium verbrauchten Mengen, im Gegensatz zum Avertin bei Evipan-Natrium aber auch gar nicht anzunehmen, da es sehr rasch anflutet, aber auch steil wieder abflutet. — Bei diesen allerdings erfolgreichen Versuchen der Start-Narkose wandten wir meist nur um ein geringes höhere Dosen, als zum Einschlafen erforderlich waren, an, d. h. eine geringere Menge, als zur Evipan-Narkose sonst verabfolgt wurde. Wie recht wir daran taten, ersieht man vor allen Dingen daraus, daß Gocke feststellte, daß die Toleranzgrenze gegenüber dem Inhalationsnarkotikum durch Evipan herabgesetzt wird, wodurch sich die Narkose leicht vertiefen und es zu Asphyxiegefahr kommen soll.

Die Verwendung von Evipan in Verbindung mit Chloroform führten wir als ausgeprochene Start-Narkose nur einmal mit gutem Erfolg aus, und zwar verabfolgten wir hierzu 6 ccm Evipanlösung, womit wir jegliches Exzitationsstadium ebenso wie bei den Äthernarkosen ausschalten konnten. Die Erfahrungen mit diesen Evipan-Start-Narkosen sind zwar an zahlreichen anderen Krankenhäusern und Kliniken recht gut, wir aber konnten gegenüber der Avertin-Basis-Narkose in diesem Verfahren keine besonderen Vorteile erblicken. Außerdem scheint die Anwendung von Chloroform nach Evipan-Injektionen in der Tat gefährlich zu sein, berichtet doch Holtermann von einem Zwischenfall — allerdings mit günstigem Ausgang — wo es nach Verabfolgung von nur 10 bis 20 Tropfen Chloroform zu livider Verfärbung, Atemstillstand, lichtstarren, weiten Pupillen und kleinem Puls kam.

Evipan bei Lokalanästhesie wandten wir als Vorsatz-Narkose zur schmerzlosen Ausführung der Lokalanästhesie bei ängstlichen und psychisch leicht alterierten Patienten an. Wir nahmen so einmal eine Sektio vor, zweimal führten wir bei Interruptio eine parametranale Anästhesie und einmal eine Pudendusnästhesie bei vorderer

und hinterer Plastik aus. Mit den Ergebnissen waren wir recht zufrieden, in den meisten Fällen dürfte jedoch eine Evipan-Vorfalls-Narkose bei Lokalanästhesie überflüssig sein. Es liegen auch hier zahlreiche gute Erfahrungen an anderen Kliniken vor, auch Lumbalanästhesien wurden andernorts mit dieser Methode ausgeführt. Einige verwenden jedoch eine etwas andere Technik. So glaubt z. B. Frigyesi zu einer Vereinfachung der Lokalanästhesie bei gynäkologischen Laparotomien durch die Zwischenschaltung einer kurzen Evipan-Narkose beigetragen zu haben. Er eröffnet nämlich in Lokalanästhesie die Bauchdecken und führt dann unter Zwischenschaltung einer Evipan-Narkose innerhalb des Abdomens eine zweite Anästhesierung aus. Kirchner und Lotheisen empfehlen eine intramuskuläre Evipan-Injektion vor der Lokalanästhesie, wodurch diese bedeutend wirkungsvoller werden soll.

Eine Vorbereitung der Evipan-Narkose mit 0,02 Morphin wandten wir nur einmal bei der Naht eines totalen Dammrisses versuchsweise an, wobei wir eine Schlafzeit von insgesamt 35 Minuten ohne Zwischenfall erzielten. Im Schrifttum sind ähnliche Versuche mit Morphin, Artopin, Scopolamin, Eudokal, Dilauid, Pontopon, Domopon (Frigyesie, Langsteiner, Geiger, Weigel, Recchioni, Caffier u. a.) angegeben und scheinen keine Zwischenfälle erbracht zu haben. Weber verwendet zur Vorbereitung Sedativa. Beachtlich ist bei der Vorbereitung der Evipan-Narkose mit anderen Medikamenten die damit erzielte, auch von uns beobachtete Narkoseverlängerung. Caffier erzielte mit Dilauid Narkoseverlängerungen um ein halbe Stunde. Weigel sagt, sie verlängern, drei Viertel bis eine halbe Stunde vor der Operation gegeben, die Narkosedauer um das zwei- bis dreifache. — Wir nahmen jedoch von der Vorbereitung der Evipannarkose mit Medikamenten abstand, da hierdurch die Tiefe der Evipan-narkose unberechenbar wird und völlige Steuerlosigkeit der Narkose mit Kumulationsgefahr eintritt, zumindest aber die bei reiner Evipannarkose erzielte weitgehende Steuerbarkeit abnimmt.

Eine Nachinjektion von Evipannatrium nahmen wir nur einmal bei einer Abrasio mit nachfolgender Portio-Amputation vor. Nach einer ersten Injektion von 8,5 ccm Evipan wurde die Patientin nach 20 Minuten unruhig. Wie spritzten hierauf 3 ccm Evipannatriumlösung nach, womit wir eine Narkoseverlängerung von aber-

mals 15 Minuten erzielten. Von weiteren Versuchen in dieser Richtung nahmen wir trotz der anseheinenden Brauchbarkeit der Methode zugunsten der Ätherzusatznarkose als der bequemerem Abstand, genügten doch in zahlreichen Fällen einige Tropfen Äther, um den Eingriff zu Ende zu führen. Andererseits hätte der Narkotiseur den Patienten verlassen müssen zwecks Herstellung der Evipanlösung und Vornahme der Injektion, es wäre also eine weitere Person zum Kieferhalten und Überwachen der Narkose erforderlich gewesen. Bei länger dauernden Operationen hätte man zur Erhaltung der erforderlichen Narkosetiefe noch ein drittes Mal und mehr injizieren müssen, wobei man bei den häufig schlecht entwickelten Venen bei weiblichen Patienten auf Schwierigkeiten gestoßen wäre. Auch ein Liegenlassen der Nadel mit den Unannehmlichkeiten des Herausrutschens oder der Verstopfung der Kanüle, der Thrombosierung der Vene schafft hierbei keine Abhilfe, hinzu kommt noch die Schwierigkeit der Nachinjektion bei dem gelegentlich auftretenden Zittern der Patienten in der Evipannarkose bzw. bei der Injektion. Zur Vereinfachung der Technik der protrahierten Evipannarkose ist in München zwar eine besondere Nadel bzw. ein Apparat konstruiert worden, trotzdem möchte ich diese Narkoseart einmal als zu umständlich, dann aber auch vor allen Dingen als zu gefährlich ablehnen. Trotz guter Erfolge andernorts mit der protrahierten Evipannarkose erscheint mir die Verwendung der teilweise recht erheblichen Evipanmengen immerhin gewagt. So spritzte Gironcoli bis zu 24 ccm, Geiger sogar bis zu 32 ccm der üblichen 10%igen Evipannatriumlösung protrahiert bzw. fraktioniert angeblich ohne Nachteil ein. Es sind aber verschiedentlich bei der protrahierten Evipannarkose Todesfälle beschrieben worden, die m. E. mit Sicherheit sonst vermeidbar gewesen wären. Holtermann z. B. führt zwei solcher Zwischenfälle bei Nachinjektion von Evipannatrium, darunter einen mit tödlichem Ausgang, an, vielleicht wären beide Fälle bei Verwendung der einfachen Ätherzusatznarkose vermeidbar gewesen. Auch Anschütz hält die fraktionierte Dosierung für gefährlich und sagt, es ließe sich dagegen einwenden, daß es leicht zur Überdosierung kommen könne, da man die Abbaugeschwindigkeit der ersten Gabe nicht kenne. Er sagt aber weiter, man müsse dies noch nachprüfen, da verschiedene Autoren selbst stundenlange schwierige Operationen erfolg-

reich durchgeführt haben. Ich dagegen glaube, daß die pharmakologisch begründete Bezeichnung des Evipannatriums als „Kurz-narkotikum“, — zumal bei der nur intravenös möglichen, also nicht resp. nur schwer steuerbaren Anwendungsform zur Narkose — seine Verwendung auf kurz dauernde Eingriffe beschränkt und seine Anwendung zu stundenlangen Operationen verbietet.

Wiederholte Injektionen in Abständen von Tagen, wie wir sie z. B. bei Radiumeinlagen, zur Interruptio etc. verwendeten, sind meiner Ansicht nach unbedenklich; Ansprechbarkeit und Verträglichkeit sind gleichgültig wie bei der ersten Injektion (V o g t, D e i n - h a r d t.) Die benötigte Dosis ist jedoch jedesmal neu zu bestimmen.

Da einem bei Durchsicht der Literatur die unterschiedliche Bezeichnung der einzelnen Narkosearten und -stadien auffällt, halte ich die Festlegung einer einheitlichen Namenklatur für ein dringendes Erfordernis. So bezeichnen die einen die Evipannarkose als Evipandämmer Schlaf, Evipanschlaf oder auch als Evipanvollnarkose, während andere wieder darunter etwas Spezielles verstehen. Andererseits werden die verschiedensten Bezeichnungen zur Kennzeichnung gleicher Narkosearten gebraucht; so nennen sie z. B. die protrahierte Evipannarkose nur Evipanvollnarkose, während andere hierunter eine gewöhnliche tiefe Evipannarkose verstehen usw.

Ich schlage daher vor, bei operativen Eingriffen im allgemeinen nur noch von

1. Evipanrausch,
 2. Evipannarkose,
 3. protrahierter Evipannarkose
- zu sprechen.

Bei Zusatz von anderen Medikamenten, Narkose- und Anästhesierungsmitteln zur Evipannarkose von

1. Vorbereitung der Evipannarkose mit Medikamenten,
 2. Evipan-Ätherzusatznarkose,
 3. Evipan-Äther- bzw. Chloroform-Startnarkose,
 4. Evipan-Voratznarkose bei Lokalanästhesie bzw.
 5. Evipaneinschaltungsnarkose
- zu reden.

Bei Geburten dagegen empfiehlt es sich unter geringfügiger Abänderung der Vorschläge *Holtermanns* von

1. Evipannarkose,
2. nicht weckbarem Evipan-Dämmer Schlaf,
3. weckbarem Evipan-Dämmer Schlaf

zu sprechen, wobei diese drei Narkosearten auch protrahiert zu den verschiedensten Geburtsphasen gegeben werden können. (Nebenbei sei noch erwähnt daß von *Nordmeyer*, *Distel* und *Gromelski* auch eine rektale Evipananwendung in der Geburtshilfe erfolgt ist.) Diese drei Narkosearten können natürlich auch fließend ineinander übergehen. Die verschiedene Wirkung der Evipanverabfolgung auf Geburtsfortschritt, Wehen, Mitpressen etc. bei der nur in der Geburtshilfe üblichen Dosierung erfordert nämlich dringend diese anderen Narkosebezeichnungen. Ist doch bei der Evipannarkose die Wehentätigkeit und das Mitpressen aufgehoben, es kommt nicht nur zu einer starken Hemmung des Geburtsfortschritts, sondern meistens sogar zu völligem Geburtsstillstand. Im nicht weckbaren Evipandämmer Schlaf wird die Wehentätigkeit nur unwesentlich gestört, es kommt bei Rückkehr der Reflexe zum Wiedereinsetzen der Wehen, während die Bauchpresse noch fehlt oder unzureichend ist. Der Geburtsfortschritt ist hierbei gering und unberechenbar, während im weckbaren Evipandämmer Schlaf mehr und mehr die Bauchpresse wieder in Erscheinung tritt und bei guten Wehen dann auch ein schnelles Fortschreiten der Geburt stattfindet. Von Dämmer Schlaf bei den beiden letzten Narkosearten zu sprechen, ist aber berechtigt, da es sich bei diesen Narkosestadien um ein Mittelding zwischen Narkose und Wachsein handelt und die Patienten dem völligen Wachsein schlafend entgegendämmern. Es bestehen für die Evipannarkose und den nicht weckbaren Evipandämmer Schlaf völlige Amnesie, für den weckbaren Evipandämmer Schlaf, je nach der Schlaftiefe totale Amnesie oder nebelhafte, nicht unangenehme Erinnerungen an die Geburtsvorgänge. Wegen der Schwierigkeit der Verabfolgung des Dämmer Schlafs über Stunden beschränkt sich *Holtermann* auf die Austreibungsperiode.

Er injiziert bei guten Preßwehen und voraussichtlich in 10 bis 20 Minuten zu erwartender normaler Geburt 2½ bis 3 ccm der 10%igen Evipannatriumlösung. Bei Unruhe, was er in jedem Fall

als Zeichen der Unterdosierung ansieht, spritzt er erneut eine $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ ccm kleinere Dosen als zuerst. Er sah bei dieser Dosierung keine Schäden für Mutter und Kind, keine Häufung von Nachgeburtsblutungen oder Störungen der Plazentalösung, trotzdem er im Durchschnitt hin und wieder den Dämmer Schlaf in Vollnarkose überleitete. Später beschränkte sich jedoch auch Holtermann auf den letzten Teil der Austreibungsperiode, obwohl auch größere Geburtsabschnitte in einer Art Dämmer Schlaf mit Erfolg geleitet wurden (Samuel, Metz u. a.). Da Holtermann später nach Sammlung größerer Erfahrungen doch eine Beeinträchtigung der Nachgeburtsperiode im Sinne einer Verlängerung, evtl. sogar eine gewisse Neigung zu Nachgeburtsblutungen feststellte, gab er prophylaktisch 1—1,5 V.E. Hypophysenhinterlappenpräparate, wobei er feststellte, daß hierdurch die Nachgeburtsperiode sogar verkürzt und ausgesprochen blutarm ist. Eine gewisse Neigung zu Nachblutungen hat weiter Vogt festgestellt, Deinhardt sogar verwendet wegen starker Nachgeburts- und Nachblutungen Evipan in der Geburtshilfe nicht mehr. Schell bemerkte bei fraktionierter Dosierung Wehenverschlechterung. Traube stellte ein Nachlassen der Wehenintensität fest und empfiehlt daher, vorher Wehenmittel zu verabfolgen. Wenn wir bei unseren eigenen Versuchen auch nie eine Nachblutung oder Nachgeburtsverlängerung feststellten, erscheint mir die prophylaktische Verabfolgung von geeigneten Medikamenten sowohl wegen der Nachblutungsgefahr, der Verlängerung der Nachgeburtsperiode, als auch der Wehenbeeinträchtigung sehr ratsam, denn ein Mittel, das wie Evipan einen völligen Geburtsstillstand in hoher Dosierung, d. h. bei der Verwendung als Evipan-narkose, hervorrufen kann, beeinträchtigt natürlich auch in kleineren Dosen die Uteruskontraktionen. Aus diesen Gründen dürften sich die protrahierten Evipan-Narkosearten auch in der Geburtshilfe verbieten, wie sie Metz, Samuel u. a. verwenden. Es ist also auch hier wieder die Verwendungsmöglichkeit des Evipans in der Geburtshilfe eine Frage der zielbewußten Dosierung und großer praktischer Erfahrungen. Gegen eine Verabfolgung von 2 bis 3 ccm Evipanatrium zehn Minuten vor der Geburt zum Durchtrittsdämmer Schlaf, wie es auch Vašek empfiehlt, ist meiner Ansicht nach nichts einzuwenden. Ich glaube auch gerne, daß man bei diesen geringen Evipan-Dosen nie Schädigungen bei Mutter und Kind in

Form von Asphyxie gesehen hat, wie dies Bauereisen, Bortini, Deinhardt, Doerfler, Holtermann, Traube, Vašek etc. betonen. Wann aber kann man sagen, die Entbindung erfolgt in 10 bis 20 Minuten, wenn man dazu noch ein wehenverschlechterndes Mittel einspritzt! Dazu kommt noch, daß man über den Wert einer Narkose in einem solch kleinen Geburtsabschnitt, wie es der Durchtritt des vorangehenden Teils darstellt, sehr geteilter Meinung sein kann. Es fragt sich weiter, ob denn die Durchtrittsperiode tatsächlich der schmerzhafteste Teil während des ganzen Geburtsverlaufs ist. So lehnt z. B. Küstner Evipan in der Geburtshilfe ab, da das Hauptgewicht auf die Eröffnungsperiode zu legen ist, sonst aber während der anderen Geburtsabschnitte die Evipanverabfolgung in hierzu geeigneter Form zu schwierig ist. Ich bin der Ansicht, daß eine Frau, wenn sie doch die ganzen anderen Geburtsphasen ohne Erleichterung durchgemacht hat, auch ruhig den kurzen Moment des Durchtritts noch aushält, zumal sie ja dann durch die Geburt des Kindes und den weiteren in der Regel schmerzfreien Verlauf mit den ganzen Schrecknissen der Geburt ausgeföhnt ist. Wir haben daher bei der Spontangeburt Evipan nur einmal beim Durchtritt des Kopfes, zweimal bei Steißlage zur Extraktion benutzt, wobei die letztere Anwendung ja schon nicht mehr in das Gebiet der eigentlichen Spontangeburt, sondern mehr in das Gebiet der operativen Geburtshilfe fällt. Ich glaube weiter, daß in der spontanen Geburtshilfe die Evipanverwendung wegen der geringen Vorteile und der Gefahr erheblicher Nachteile überflüssig ist. Dazu kommt noch das dringende Erfordernis der Vorsicht bei Verwendung von Evipan an Kreißenden hinzu infolge der Mehrbelastung des Körpers durch Frucht und Geburt, die ja für den Kreislauf etc. der Mutter nicht gleichgültig sind, weiter infolge anderer schwangerschaftsbedingter Stoffwechselveränderungen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit einen von Scheffzek zitierten Fall anführen:

Bei einer 38jährigen IX. gebärenden Landwirtsfrau trat bei einer Dosis von 6 ccm Evipan eine schwere Atemlähmung auf, die etwa eine Stunde lang andauerte. Nach Lobelin und Cardiazol verschwanden zwar die bedrohlichen Anzeichen, während die oberflächliche Atmung noch einige Stunden anhielt. — Vielleicht liegt in dem vorhin Gefagten die Erklärung für diesen Zwischenfall. Holter-

man n verfuht derartige Einwendungen dadurch zu widerlegen, daß er sagt, daß im allgemeinen die Vorbedingungen bei Schwangeren schon allein wegen des jugendlichen Alters recht günstige seien. Er erläutert dies daran, daß er erwähnt, daß z. B. die von Stimpfl zusammengestellten 11 Todesfälle — abgesehen davon, daß sie nach kritischer Beurteilung von Anschütz und Stimpfl durch absolute oder relative Überdosierung bedingt sind und nach Stimpfl von einer auffallenden Gefährdung in der Geburtshilfe außer dem bereits erwähnten Fall von Scheffzek, nichts berichtet ist — mit einer einzigen Ausnahme ältere Personen über 40 Jahre betrafen (7 Frauen, 4 Männer; das Alter betrug einmal 86 Jahre, einmal 75, einmal 72, einmal 63, einmal 59, einmal 50, einmal 48, einmal 43, einmal 24, zweimal ? Jahre). Holtermann folgert hieraus, daß das Lebensalter eine nicht unwichtige Rolle spiele einem bei der Analyse der Todesfälle Stimpfl's auf, sein scheinen. Bei den Todesfällen befänden sich nur zwei im gebärfähigen Alter, dagegen sieben von neun jenseits davon. Außerdem spiele einem bei der Analyse der Todesfälle Stimpfl's auf, daß darunter kein Fall vorhanden sei, bei dem nicht schwerste Organ- oder Systemschäden (Myodeg. cordis, Thyreotoxikose, schwerer Diabetes, schwere Arteriosklerose, allgemeine Kachexie und ähnliches) oder schwerste Infektion (Peritonitis, Sepsis) vorlag. Selbst bei den gut ausgehenden Zwischenfällen hätten nur mit wenigen Ausnahmen die Verhältnisse ähnlich gelegen. Holtermann erwähnt dann aber selbst einen Todesfall bei einer Perforation des kindlichen Kopfes, allerdings bei Fieber unter der Geburt, Pulsalteration und nicht erkannter, angeblich bereits bestehender Leberschädigung, den ich bereits beim Hinweis auf die Gefährlichkeit der Evipannachinjektion bzw. der protrahierten Evipannarkose erwähnt habe. — Wenn Holtermann glaubt, daß die Evipannarkose in der Geburtshilfe wegen des vorwiegend jugendlichen Alters so sehr ungefährlich ist, hat dies natürlich in gewissem Maße seine Richtigkeit. Er vergißt dabei aber ganz und gar die Möglichkeit einer Schädigung der Kinder. Unsere nur wenig zahlreichen Erfahrungen in der Geburtshilfe mit Evipannarkosen haben aber in der Verabfolgung von Evipan bei lebendem Kind resp. besser erwarteter Lebendgeburt eine Kontraindikation erbracht. Während Wladika lediglich Bedenken gegen die Evipananwendung bei

der Spontangeburt äußert, weil es nicht feststeht, ob nicht die Barbitursäure schädliche Wirkungen auf das Kind hat, Evipan sich ihm sonst aber gut bei entbindenden Operationen bewährt hat, konnten wir uns auf Grund eigener Erfahrungen nicht des Eindrucks erwehren, daß das Evipan auch auf die Kinder übergeht und Asphyxie hervorrufen kann. Wir stehen zwar mit dieser Erfahrung anscheinend völlig allein, wundern uns aber eigentlich, daß nicht auch schon andere Untersucher diese Feststellung gemacht haben. Weiter sage ich, ist es doch logisch, daß, wenn Evipan schon beim Erwachsenen Atemlähmungen und Kreislaufstörungen hervorrufen kann, es natürlich bei Kindern unter besonderen Umständen auch ungünstig auf das Atemzentrum und den Kreislauf einwirken kann. Das macht natürlich nichts oder nur wenig aus, solange das Kind noch unter der Geburt steht, bzw. sich intrauterin noch im Plazentarkreislauf befindet, kann aber zur Asphyxie führen, sobald die Geburt zu einem Zeitpunkt erfolgt, wo das kindliche Blut noch stark mit Evipan vermischt ist, zum Beispiel bei schneller Entwicklung eines Kindes kurz nach der Evipanjektion, bei Beckenausgangszange oder entsprechend schnell erfolgender Geburt bei Manualhilfen oder auch bei Spontanentbindungen. Es müßte natürlich geklärt werden, ob sich tatsächlich Evipan im Nabelschnurblut nachweisen läßt. Dies scheint aber nach unseren klinischen Erfahrungen der Fall zu sein.

Bei einer Zange, die wegen protrahierter Austreibung gemacht wurde, waren die kindlichen Herztöne regelmäßig 144, sofort nach der Evipanjektion jedoch stark wechselnd 160—180—110. Es handelt sich um eine mittelschwere Zange, das Kind wurde blau-asphyktisch geboren. Die Injektionsmenge betrug 8 ccm, die Narkosedauer 15 Minuten.

In einem anderen Fall wurde ein Forceps bei tiefem Querstand in Evipannarkose gemacht, das Kind kam blau-asphyktisch zur Welt, schrie einen Tag lang schlecht und war somnolent. Auch hier betrug die Injektionsmenge 8 ccm, die Narkosedauer 12 Min.

In einem weiteren Falle wurde bei einer Rachitika mit Rippenbuckel und dekompensiertem Herzfehler im Evipanschlaf im Interesse des Kindes mittels Kaiserschnitt die Entbindung ausgeführt, das Kind wurde ebenfalls asphyktisch geboren und schrie erst nach längeren Bemühungen.

Aus diesen Gründen wurden in der Geburtshilfe bei erwarteter Lebendgeburt nur 26 Evipannarkosen ausgeführt, und zwar bei:

Epifiotomie	15
Extraktion	2
Sektio extraperitonealis	3
Spontangeburt	1
Zangen	5

Die übrigen Kinder wurden lebensfrisch geboren, jedoch kamen hierbei geringere Evipanmengen zur Anwendung (5 bis 7 ccm). Zu erwähnen ist jedoch, daß sich unter der Zahl von 121 Narkoseuntersuchungen zahlreiche gravide Personen befanden, bei denen nachteilige Folgen der Evipanverabfolgung nicht beobachtet wurden. Dies aber scheint gerade meine These, daß es ein Unterschied ist, ob sich ein Kind während der Evipanwirkung noch im Plazentarkreislauf befindet oder nicht, zu bestätigen. Ebenso erscheint mir hiermit die Wichtigkeit der seit der Evipainjektion verstrichenen Zeitspanne, wegen der davon abhängigen mehr oder weniger starken Evipananhäufung im kindlichen Blut zur Zeit der Entbindung, für die Gefährdung oder Nichtgefährdung des Kindes bewiesen. Bei der Auswertung der soeben angeführten Asphyxiefälle bei Neugeborenen als Kontraindikation ist natürlich einschränkend zu berücksichtigen, daß es sich bei diesen Entbindungen nicht um normale Geburten handelte, aus welchem Grunde eine schon vorher stattgefundene oder durch die Art des operativen Eingriffs hervorgerufene Schädigung nicht in Abrede gestellt werden kann. Ebenso kann die Geburt eines bleich-asphyktischen Kindes, die durch Schnittentbindungen nach Verabfolgung von 7 ccm Evipan bei uns erfolgte, der intravenösen Evipannarkose nicht zur Last gelegt werden, handelte es sich doch in diesem Falle um eine totale Querlage mit Arm- und Nabelschnurvorfall. Viel wahrscheinlicher war hier der Tod des Kindes auf einen zu langen Zeitraum bis zur operativen Entbindung zurückzuführen, trotzdem sofort nach Vorfall der Nabelschnur eingegriffen wurde.

Der Vorsicht halber lehnten wir jedenfalls nach diesen Erfahrungen die Evipannarkose bei lebendem Kind vor erfolgter Geburt ab.

Da wir von einer erhöhten Blutungsbereitschaft sowie von einer Verlängerung der Nachgeburtsperiode nichts bemerkt hatten,

wendeten wir Evipan sonst in der Geburtshilfe ruhig weiter bei den verschiedensten sonstigen Anlässen an. Eine Übersicht über die 74 Evipannarkosen, die wir in der Geburtshilfe ausführten, ergibt die zu Anfang meiner Arbeit befindliche Tabelle. Zieht man nun aus meinen Ausführungen über das Kapitel Geburtshilfe die Konsequenzen, so stellt man fest, daß die guten Erfahrungen *Holtermanns*, *Vášecku* a. wohl auf der geringen Evipandosis von 2 bis 3 ccm, die sie unter der Geburt verwenden, beruhen. Auch stellte *Holtermann* den Satz auf, daß Kreißende grundsätzlich geringere Dosen benötigen als Frauen außerhalb der Geburt. Unverständlich jedoch ist mir das Ausbleiben von Kindererschädigungen sowohl bei höheren Einzeldosen, als auch bei Überführung des Dämmer schlafs in die Narkose, sowie bei den protrahierten Evipannarkosen oder Dämmer schläfen, wie sie z. B. *Samuel* und *Metz* über größere Geburtsabschnitte ausführten, wobei Dosen von 12 bis 14 ccm innerhalb von etwa 2 Stunden (*Metz*) protrahiert, teilweise sogar 8 bis 8,5 und 10 ccm als Einzelgabe (*Traube*), sei es nun bei Spontangeburt oder operativen Entbindungsmethoden gegeben wurden. Abgesehen von den tatsächlich beobachteten Nachblutungen, der Verlängerung der Plazentarperiode und der Gefahren für die Mutter selbst bei solch hohen Dosen, die ich ja eindeutig vorher schon bei den Operationen außerhalb der Geburtshilfe teilweise besprochen habe. Obwohl ich zugebe, daß wir mit Evipan in der Geburtshilfe aus den dargelegten Gründen zahlenmäßig nur geringe Erfahrungen sammeln konnten, glaube ich trotz der zahlreichen, mit wenigen Ausnahmen nur guten Erfahrungen anderer, daß unserer Vorsicht und Ablehnung des Evipans vor erfolgter Geburt berechtigt ist. Den Satz *Holtermanns* „Wir kennen außerdem kein Narkosemittel in der Geburtshilfe, dessen Übergang auf das Kind so wenig in Erscheinung tritt wie das Evipannatrium“ muß ich natürlich nach unseren Erfahrungen ablehnen.

Nachdem ich nun die Wirkungen des Evipannatriums auf im allgemeinen organgefunde Patienten beschrieben habe, komme ich nun nach Erledigung der Geburtshilfe, die zwar etwas Normales darstellt, andererseits aber doch gewissermaßen als Mittelding zwischen Krankheit und Gesundheit aufgefaßt werden kann, — zumal sich hier bei der geringsten Komplikation Gesundheit und Krankheit eng berühren und ineinander übergehen können — auf die

Evipanwirkungen bei nicht ganz Körpergefunden und konstitutionell Kranken zu sprechen. Hiermit aber berühre ich gleichzeitig die in der Literatur beschriebenen Zwischen- und Todesfälle und die bisher angewendeten Gegenmittel, sowie die sich daraus ergebenden Kontraindikationen für die Evipananwendung.

Bei Bestehen von Hyperemesis Gravidarum fahen wir keinerlei nachteilige Folgen, vielmehr verschwand nach der zu einer Narkoseuntersuchung verabfolgten Evipaninjektion, bei der wegen der Frage einer Interruptio eingewiesenen Patientin, unter geeigneter Psychotherapie das vorher auch von uns beobachtete unstillbare Erbrechen vollkommen, wobei allerdings die Patientin sich eingeildet hatte, es sei in der Evipannarkose eine Interruptio tatsächlich vorgenommen worden. Die Austragung der Schwangerschaft wurde auf diese Weise bezweckt und auch erreicht. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, daß eine Verwendung von Evipan bei Hyperemesis Gravidarum von anderer Seite als kontraindiziert erachtet wird (Stamm).

Auch bei bestehender Tuberkulose führten wir zweimal ohne Verschlechterung des Allgemeinbefindens im Evipanschlaf die Interruptio aus, wobei wir die Evipannarkose für günstiger als eine Inhalationsnarkose hielten. Bemerkenswert ist hierbei, daß wir am ersten Tage Laminaria legten und dann am zweiten Tage die Ausräumung vornahmen. Die Anwendung von Evipan bei Tuberkulosen wird auch von Caffier, Mikulicz-Radecki Schulz, Vogt, Kessler, Holmann und Mathieu u. a. empfohlen, so daß man sicherlich annehmen kann, daß sich dieses Verfahren bewährt hat. Es müßte jedoch die Ansicht von Lungenspezialisten hierüber abgewartet werden.

Bei der Präeklampsie und Eklampsie halten wir jedoch wegen der hiermit verbundenen Leber- und Nierenschädigungen die Evipannarkose für kontraindiziert, wird doch durch die Leber das Evipan in der Hauptsache abgebaut und durch die Nieren ausgeschieden. Wenn wir auch bei Eklampsie zweimal Evipannatrium ohne nachteilige Folgen verwendeten, desgleichen einmal bei Präeklampsie, so erlebten wir doch bei einer weiteren Patientin mit Eklampsie einen Exitus 10³/₄ Stunden nach erfolgter Evipaninjektion unter den Zeichen allgemeiner Herz- und Kreislaufschwäche. Wie weit hieran das Evipan mitbeteiligt war, läßt sich naturgemäß

schwer feststellen, da es sich um einen schweren Eklampsiefall handelte und die Patientin bereits zu Hause drei Anfälle durchgemacht hatte und andererseits bereits vor der Narkose ziemlich erschöpft und schläfrig war. Jedenfalls reagierte die Patientin erst sieben Stunden nach erfolgter Narkose nur vorübergehend auf Anruf. Die Sektion ergab typische Eklampsie mit Leberblutungen. — Nebenbei sei hier erwähnt, daß wir nach Evipaninjektionen keineswegs ein vermehrtes Auftreten der eklamptischen Anfälle beobachteten, wie dies Köhler infolge einer gewissen Krampfbereitschaft nach Evipaninjektionen vermutete und weshalb er die Evipanverwendung bei Eklampsie nicht für angebracht hielt.

Nach dieser Erfahrung hielten wir natürlich auch bei Lebererkrankungen Evipan für kontraindiziert und mutmaßten das Gleiche bei Nierenerkrankungen und verhielten uns danach.

So beobachtete Simmenauer bei einer 74jährigen Patientin mit Icterus schon bei 0,5 ccm Toleranz. Weiter erwähnt Ansfchütz als Kontraindikation für Evipan Lebererkrankungen und Leberschädigungen und sagt weiter, daß Vogt einen Todesfall mit einer akuten gelben Leberatrophie von Holtermann erwähnt habe. Frigyesie sieht in der Evipananwendung bei ungenügender Leberfunktion ein Kontraindikation, Langsteiner bei Leberschädigung. Stimpfl sagt, nach dem Studium der Literatur prädisponieren Leberleiden zu Komplikationen. — Zum weiteren Beweis dieser Kontraindikation möchte ich nun den von Ansfchütz und Vogt zitierten Todesfall an akuter Hepatose von Holtermann ausführlich anführen, den ich bereits beim Hinweis auf die Gefährlichkeit der Evipannachinjektion bzw. protrahierter Evipannarkose und bei der Gefährlichkeit der Evipanverabfolgung in hohen Dosen unter der Geburt kurz gestreift habe. Es handelte sich um eine Patientin bei der unter der Geburt Fieber bis 39,4 aufgetreten war bei einer Pulszahl von 172. Die Patientin erhielt zuerst 6 ccm Evipan, dann noch abermals 4 ccm. Hierauf Perforation des kindlichen Kopfes und Extraktion. Nach der zweiten Injektion trat Zyanose, Erbrechen, tiefes Toleranzstadium mit sehr kleinem frequenten Puls und langsamer, tiefer Atmung auf. Trotz Verabfolgung von Analeptika und Cardiac, wie Coramin i. v. u. ä. trat keine Erholung ein. Der Exitus trat zwei Stunden nach Operationsbeginn unter Zeichen von Kreis-

laufinsuffizienz ein. Die Autopsie ergab: Hochgradige Blutstauung in den parenchymatösen Organen, Diapedesisblutungen in der Hirnsubstanz, ausgedehnte Parenchymblutungen in beiden Nebennieren. (ähnlich wie bei Neugeborenen), subakute Dilatation des linken Ventrikels, trübe Schwellung und kleine Blutungen in beiden Nieren. Die Leber bot ein charakteristisches Bild: Trübe Schwellung, strotzende Füllung der Leberkapillaren, Verfettung, Glykogenschwund und eine hochgradige Dissoziierung der Leberzellbalkenstruktur, — kurzum das, was man nach R ö ß l e mit akuter Hepatose zu bezeichnen pflegt. Es erfolgte demnach hier kein Tod infolge akuter, absoluter Überdosierung, dafür fehlt die hierfür typische Atemlähmung. Es handelte sich hier um einen Kreislauftod, wie er schon mehrfach als Todesursache beschrieben wurde. Holtermann folgert nun weiter hieraus: unter den bisher bekannten Evipantodesfällen befinden sich 4 (Killian, Schmörl, Schmid zweimal), die unter reiner Kreislaufinsuffizienz endeten, in allen 5 Fällen jedoch handelte es sich um einen Narkosetod bei bestehender Infektion. In Übereinstimmung mit den Obduzenten (Heinlein und Weele) glauben wir, daß es sich nicht um einen spez. Evipannarkosetod, wohl aber um einen Narkosetod handelt. Die akute Hepatose beruht auf akuter Infektion, diesem Infekt schreiben wir die Beeinflussung des Kreislaufs zu (primär oder sekundär), erkenntlich u. a. auch an dem sehr hohen Puls von 172 bei einer Temperatur von nur 39,4° unter der Geburt. Hierbei wären vielleicht auch andere Narkosen tödlich gewesen. Holtermann warnt nun vor Allgemeininfektionen mit Verdacht auf Leberparenchymschäden. So hat er den von Anschütz zitierten Fall von Evipannarkose bei akuter gelber Leberatrophie beobachtet (Vogt irrt, wenn er glaubt, es sei ein Evipannarkosetod. Der Tod erfolgte an akuter gelber Leberatrophie). Bei Schwangerschaftsnephropathie, Präeklampsie, Eklampsie, die ebenfalls Leberparenchymschädigungen aufweisen können, hält er Evipan nicht für kontraindiziert, jedoch rät er von wahlloser Anwendung ab, da man hierüber noch nicht genügend Material gesammelt habe. An anderer Stelle berichtet er dann noch von einem Fall mit schlechter Ausscheidung bei akuter gelber Leberatrophie mit sechsständigem Schlaf nach 3,5 ccm Evipan und rät daher hierbei, als auch bei akuten Infektionen von Evipan ab. — Ich persönlich

möchte hierzu bemerken, daß der Zwischenfall *Holtermanns* vielleicht bei Verwendung einer Ätherzufatznarkose an Stelle der prolongierten Evipannarkose vermeidbar gewesen wäre, worauf ich bereits früher schon einmal hingewiesen habe. Weiter ist doch wohl die Frage berechtigt, ob es denn nicht evtl. durch zu hohe Evipandosen, Anwendung der prolongierten Evipannarkose, zu schnelles Spritzen von Evipan, Anwendung von Evipan bei hohem Fieber, Kreislauffschwäche etc. zu einer Leberschädigung, akuter Hepatose und in besonders schwerwiegenden Fällen auch zu einer akuten gelben Leberatrophie kommen kann. Vielleicht liegt die bisher gegoltene Kontraindikation bei Leberschädigung, akuter Hepatose, akuter gelber Leberatrophie nur an einer verhältnismäßig harmlosen Auswertung der Todes- und Zwischenfälle. Es könnte doch ebenso auch die „vorher nicht erkannte Leberschädigung“ eine Folge der Evipannarkose sein, d. h. die Folge einer falschen Dosierung, Narkosemethodik etc. Warum stellt man bei dem Exitus, den *Holtermann* zwei Stunden nach der Injektion erlebte, eine akute Hepatose fest, aber bei dem von *Anschütz* und *Vogt* zitierten Fall, den ja auch *Holtermann* beobachtete, bei dem der Exitus einige Tage nach der Injektion erfolgte, eine akute gelbe Leberatrophie? Liegt das nicht etwa nur an der Zeit, die seit der Narkose bis zum Tod resp. der Autopsie verstrichen ist. Könnte nicht in einer Zeit von Tagen und Wochen eine zum Tode führende Leberveränderung hieraus resultieren? Besteht nicht auch die Möglichkeit, daß der Fall von *König*, wo es nach einem vorübergehenden schweren Narkosezwischenfall mit Atem- und Herzstillstand bei Spaltung eines Bauchdeckenabszesses gekommen war, sich ähnlich verhält? Der Tod trat nämlich vier Wochen später an Leberinsuffizienz ein. Der Wichtigkeit halber möchte ich auch diesen Fall ausführlich schildern. *König* sagt, es handelte sich um eine 50jährige Frau, die wegen eines Bauchdeckenabszesses nach Cholecystektomie in Evipannarkose operiert wurde. Sie erhielt 8 ccm Evipan bei einem Gewicht von 71,6 kg. Bald nach Eintritt der Narkose kam es zu Atem- und Herzstillstand. Künstliche Atmung (Pulmotor), 2 ccm Lobelin i. v., 2 ccm Cardiazol und 2 ccm Coramin i. m. waren erfolglos. Nach 1 ccm Adrenalin intracardial kurze, vorübergehende Herztätigkeit. 15 Minuten nach Beginn der Atemlähmung Injektion von 0,1 (1 ccm) Koffein suboccipital in

die Cisterna cerebello-medullaris. Wenige Sekunden danach erster Atemzug und Weiteratmung mit Sauerstoffgabe. Nach ein bis zwei Minuten fühlbarer Puls, 1 1/2 Stunden nach Beginn des Zwischenfalls Wiedererlangung des Bewußtsein. Traubenzuckerinfusion, Sympatol. Vier Wochen später Tod an Leberinsuffizienz, die auch den Evipanzwischenfall erklärt. — Ich möchte nun hierzu bemerken, daß nach allgemeiner Ansicht die Komplikation Atem- und Herzstillstand als Zeichen einer akuten Überdosierung aufzufassen ist. In diesem speziellen Fall lag also trotz der nur verabfolgten 8 ccm eine akute Überdosierung vor. Warum könnte dann nicht auch der Exitus vier Wochen nach einer Evipaninjektion an Leberinsuffizienz eine Folge der starken Überdosierung, d. h. hierdurch ursächlich hervorgerufen sein? Es besteht natürlich genau so die Möglichkeit einer bereits vor der Evipaninjektion bestehenden Leberschädigung. Aber es ist auch dann nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen, warum ein Medikament, das bei bestehender Leberschädigung diese Schäden derartig verschlechtert, daß sofortiger Exitus oder Exitus nach Tagen oder Wochen eintreten kann, nicht auch eine normale Leber, überdosiert gegeben, schädigt. Es könnte hier eingewendet werden, die Verstärkung der Leberschädigung führe ja gar nicht zum Zwischenfall, sondern die bei Leberschädigung bestehende schlechtere Ausscheidung und damit verstärkte Anschoppung von Evipan im Blut, außerdem träte eine Leberschädigung nicht ein. Demgegenüber aber könnte man entgegen, daß es doch immerhin auffallend sei, wenn es nach einem glücklich überstandenen Zwischenfall ausgerechnet bei Leberschädigungen noch nach Tagen oder Wochen zum Exitus kommt. Bei anderen Krankheiten ist ein solcher Evipan-Spättod doch nie beschrieben worden. Es könnte doch zweierlei geschehen: Evipan protrahiert oder überdosiert gegeben, löst den Zwischenfall infolge übermäßiger Anschoppung von Evipan im Blut aus, und zwar kommt es einmal infolge akuter Überdosierung, im anderen Falle bei protrahierter Evipananwendung infolge zu langer Einwirkung zu akuter Leberschädigung. Beide Vorgänge aber können in Tagen oder Wochen zum Tod an Leberinsuffizienz, akuter gelber Leberatrophie etc. führen. — Die Entscheidung hierüber müßten spätere Autopsien, die bei jedem Todesfall nach stattgehabter Evipaninjektion angestellt werden müßten, sowie das Urteil des patho-

logischen Anatomen, ob in so kurzer Zeit überhaupt derartig schwere Leberveränderungen entstehen können, ergeben. Hiergegen spricht natürlich das bisher anscheinend noch nie beobachtete Auftreten von Icterus nach Evipaninjektionen, was man dann ja eigentlich erwarten müßte. Der Autopsiefund, bei dem von *Holtermann* zitierten Fall deutet auf Schädigung der parenchymatösen Organe hin, ebenso die Leberblutungen in dem von uns angeführten Eklampsiefall. Diese Veränderungen könnten also Evipanfolgen sein, wobei ich mir jedoch voll bewußt bin, daß die beiden Autopsiebilder natürlich auch bei einer schweren Infektion, im anderen Falle aber auch bei Eklampsie bzw. anderen Lebererkrankungen beobachtet werden. Weiter sprechen gegen eine Evipanschädigung der Leber die Untersuchungen *Fuges u. a.* Daher wollen wir annehmen und hoffen, daß Evipan keine Leberschädigungen macht, sondern daß Leberschädigungen die Anwendung der Evipannarkose verbieten.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Nierenveränderungen. So hat *Scheffzek* allgemein mit intravenösen Narkosemitteln schlechte Erfahrungen gemacht, wo die Nieren nicht ganz auf der Höhe waren. Er sah hierbei sehr ernste Störungen, auch machte sich insbesondere ein langausgedehnter Schlaf unangenehm bemerkbar. Er stellt daher die Forderung auf, vorher die Nierenfunktion sicherzustellen. *Frigyesi* sieht ebenfalls in Nierenschädigungen eine Kontraindikation. *Redmann* erwähnt aus der Literatur einen Fall von Prof. *Els*, wo es bei einem 48jährigen Patienten mit Nierenschädigung im Verlauf der Narkose zu Cyanose kam. Dann aber erwähnt *Redmann* einen weiteren Fall, bei dem er evtl. Evipan für die Nierenschädigungen verantwortlich machen zu müssen glaubt. Eine 35jährige Patientin mit Abort, die seit sechs Wochen häufig morgendliches Erbrechen und Übelkeit hatte, erhielt insgesamt 8 ccm Evipan. Das Einschlafen erfolgte nach 5 ccm, fester Schlaf nach 3 ccm. Über der rechten Lunge bestand verkürzter Klopfeschall und abgeschwächtes Vesikularatmen, weiter bestand eine Kyphoskoliose. Etwa 20 Minuten nach der Injektion wurde die Atmung plötzlich ganz oberflächlich und selten, die Pupillen maximal weit und reaktionslos, der Puls klein, frequent, kaum fühlbar. Nach 10 weiteren Sekunden setzte die Atmung trotz freier Luftwege aus. Das Gesicht wurde blaß-cyanotisch, die

Pupillen blieben weit und reaktionslos. Puls fadenförmig, 5,5 ccm Coramin, 1 ccm Lobelin, 2 ccm Hexeton. Puls bleibt schlecht, Patientin atmet nicht. Hierauf künstliche Atmung, dann nach zwei Minuten abermals 5,5 ccm Coramin, 5 ccm Kampher und 1 ccm Cardiazol. Etwa sechs Minuten nach beendeter Injektion beginnt oberflächliche und unregelmäßige Atmung. Der Puls wird langsam wieder deutlich fühlbar, ist jedoch noch klein, die Pupillen reagieren wieder etwas, die Cyanose schwindet langsam, während die Blässe bleibt. Kein Erwachen. Hierauf Abrasio, Lichtbrücke, Wärmeflasche. Puls nach einer Stunde klein und langsam, Atmung oberflächlich aber regelmäßig, Pupillen mittelweit und träge reagierend. Nach 1 $\frac{3}{4}$ Stunden reagiert Patientin auf Anruf und stöhnt zeitweise. Atmung jetzt tiefer, Gesicht frischer, Puls kräftiger. Patientin ist aber weiter somnolent, nimmt keine Notiz von der Umgebung und schläft immer wieder ein. Ganz wach ist sie erst nach vier Stunden. Es besteht immer noch etwas blaßes Aussehen. Abends und am nächsten Tag heftige Kopfschmerzen. Allgemeinbefinden gut. Acht Tage später Schmerzen ziehender Natur im Kreuz, besonders rechts, Kopfschmerz, Abgeschlagenheit, kein Fieber. Sediment: reichlich Erythrozyten und mehrere granulierte Cylinder. Albumen in Spuren. Bei strenger Diät und Bettruhe nach 14 Tagen Sed.: o. B. Redmann glaubt, daß es sich hier evtl. um eine Nierenschädigung durch Evipannatrium handelt, da er dies bereits dreimal bei Patienten nach Abrasio und zwar acht Tage später festgestellt habe. Er nimmt als Ursache für den Atemstillstand die Kyphoskoliose an. Er sagt weiter, daß er seither vorsichtiger in der Anwendung des bisher gut bewährten Evipannatriums sei. — Obwohl dieser Fall auffällig ist, muß ich doch betonen, daß wir in keinem einzigen Fall eine Nierenschädigung nach Evipannarkosen feststellen konnten. Es bleibt aber wieder die Frage offen, ob Evipan in einer Dosierung, die anscheinend richtig, aber doch so hoch war, daß sie einen Zwischenfall auslöste, nicht Schädigungen parenchymatöser Organe, insbesondere der Leber und Nieren als Entgiftungs- bzw. Ausscheidungsorganen hervorrufen kann.

Im Zusammenhang mit der Mutmaßung Königs, daß in dem soeben erwähnten Fall für den vorübergehenden Atemstillstand die Kypthoskoliose anzusehen ist, möchte ich erwähnen, daß

die von mir im Kapitel Geburtshilfe erwähnte Rachitika mit Rippenbuckel, schwerer Kyphoskoliose und dekompensiertem Herzfehler, bei der in Evipannarkose mittels Kaiserschnitt ein asphyktisches Kind geboren wurde, unter den Zeichen zunehmender Herz- und Kreislaufschwäche einen Tag nach der Operation zum Exitus kam. Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, daß wir die Patientin bereits vor der Operation aufgegeben hatten und die Sektio lediglich aus kindlicher Indikation ausgeführt hatten. Auch war diese Patientin als nierengeschädigt anzusehen, hatte sie doch Ödeme und Eiweiß im Urin. Infolge des jedoch bei der Einlieferung bereits bestehenden hoffnungslosen Zustandes kann dieser Exitus unmöglich der Evipannarkose zur Last gelegt werden. Wir hatten in diesem Falle die Evipannarkose für die Mutter als schonender erachtet, als eine Inhalationsnarkose und weiter die Möglichkeit der Kinderschädigung durch Evipan nicht in Erwägung gezogen. — Ich erinnere mich bei dieser Gelegenheit eines Ausspruchs von Geheimrat Hirsch, Bonn, der erwähnte, daß jeder Kyphoskoliotiker als Herzkranker aufzufassen sei.

Daß bei Herzgeschädigten sich die Evipananwendung verbietet, hatten und haben wir selbst jedoch nie festgestellt. Jedoch beweist das Literaturstudium die Gefährlichkeit der Evipananwendung bei Herzkranken bzw. -geschädigten. So hält v. Mikulicz-Radeccki Evipan keineswegs für ungefährlich und führt als strikte Kontraindikation Veränderungen des Herzens, besonders Herzfehler an. In zwei Fällen sah er schwerste Störungen der Evipannarkose, einmal so schwere Asphyxie und Herzkollaps, daß er glaubte, die Patientin verlieren zu müssen. Intravenöse Coramininjektion bewährte sich ihm hierbei. Caffier sah bei einer 74jährigen Patientin mit schwerer Myodegeneratio vorübergehende Asphyxie von 20 Minuten. Auch Frigyesi hält Herzfehler auf Grund der in Ungarn gesammelten Erfahrungen für kontraindiziert. Weiter erwähnt Nordentoft einen Todesfall bei einer 64jährigen Frau mit Herzleiden und bedeutender Erweiterung des Herzens. Sie erhielt 7 ccm Evipan in 1½ Minuten bei Exkochleation eines dreimarkstückgroßen Tumors wegen Verdacht auf Uterus-Ca. Drei Minuten nach der Injektion trat Kollaps und Tod trotz Verabfolgung von 5 ccm Coramin i. m. und 5 ccm Coramin i. v. ein. Da die Kranke vor der Operation die sichere Überzeugung

ausgesprochen hatte, „daß sie nun sterben werde“, glaubt Nordentoft die Evipannarkose nicht mit Sicherheit für den Todesfall verantwortlich machen zu können. Eine Leichenschau hat er nicht vorgenommen. — Stimpfl sagt, daß in der Literatur Schädigungen des Herzens, Erkrankungen des Peritoneums und Leberleiden zu Komplikationen prädisponieren, er meint aber, daß bei solchen Kranken eine Alteration des Kreislaufs vorliegt, so daß sie den Anforderungen der Evipannarkose nicht mehr voll gewachsen sind. Trotzdem sieht er hierin keine strikten Kontraindikationen, vorausgesetzt, daß das Evipannatrium nur zur Kurz- und Einleitungsnarkose benutzt wird.

Eine Alteration des Kreislaufsystems liegt aber meiner Ansicht nach sehr häufig bei älteren Personen vor und in der Tat hat ja auch Holtermann versucht, ein gehäuftes Auftreten von Todesfällen mit dem Alter in Verbindung zu bringen, was ich bereits bei meiner Abhandlung über die Geburtshilfe näher erläutert habe. Auch Langsteiner sieht in der Evipanverabfolgung bei alten Leuten über 50 Jahren eine Kontraindikation. Liflard aber sieht die Kontraindikation nicht im Alter, sondern in den häufigen Begleitererscheinungen des Alterns, wie Hypertension, Kreislaufstörungen und schlechtem Allgemeinzustand. Daß diese Kontraindikation tatsächlich nicht im Alter, sondern in Kreislaufstörungen etc. zu suchen ist, erscheint mir denn doch überzeugender, haben wir doch bei unseren Narkosen nie eine besondere Gefährdung alter, sonst organgefunder Personen feststellen können.

Daß Kreislaufgestörte aber tatsächlich gefährdet werden, geht aus zahlreichen Erwägungen und auch Beobachtungen hervor. So hat Stimpfl einen Todesfall bei schwerer Arteriosklerose erwähnt. Kraul berichtet über einen Fall mit dekompensierter Hypertonie, der in Lokalanästhesie laparotomiert werden sollte. Patient erhielt zur Vorbereitung 3 ccm Evipan, Folge: Atemstillstand. Erholung erfolgte erst nach künstlicher Atmung und Campherinjektion, woraus Kraul folgert, daß man Evipan nur bei Organgefunden anwenden soll. Weiter sah Pohl bei einer ausgesprochenen Vagotonikerin, die vier Wochen vorher eine Leuchtgasvergiftung durchgemacht hatte, Cyanose und kleinen Puls auftreten, außerdem ein scharlachähnliches, stark juckendes urtikarielles Exanthem, das nach drei Tagen wieder verschwand.

Im Zusammenhang hiermit möchte ich erwähnen, daß sich Patienten mit Strumen oder Thyreotoxikosen, bei denen ja häufig Herz- oder Kreislaufalterationen vorliegen, weniger für diese Narkoseart zu eignen scheinen. Stimpfl erwähnt ja bei Thyreotoxikose sogar einen Todesfall. Wir erlebten hierbei mehrere, wenn auch nur harmlose Nebenwirkungen, wie Aufregungszustände, Schreikrämpfe und Doppelsehen. Es besteht hier die Möglichkeit, daß diese von uns beobachteten Erscheinungen auf einer gewissen Unterdosierung beruhen, die ja bei dem in diesen Fällen meist erhöhten Grundumsatz und der damit verbundenen schnelleren Ausscheidung des Evipans erklärlich wird. So wird in der Literatur einmal von einem völligen Versagen der Evipaninjektion bei einer Patientin mit Basedow berichtet, weshalb Vasek sagt, Basedowkranke zeigen eine gewisse Resistenz, er nehme in solchen Fällen die Evipaninjektion etwas schneller als sonst vor, da Evipan infolge des erhöhten Grundumsatzes zu rasch abgebaut wird und nicht zur Wirkung kommt. Auch das Zittern bei all zu langsamer Injektion läßt sich so als Unterdosierung erklären, denn einmal kommt zu wenig Evipan ins Blut, zweitens wird das Evipan unterdessen auch schon wieder abgebaut. Darin liegt aber auch die Erklärung für die sich widersprechenden Ansichten und Beobachtungen bei der schnellen und langsamen Injektion. In einem Fall nämlich erregt Evipan Zittern und ähnliche Erscheinungen als Zeichen einer Unterdosierung; bei zu schneller Injektion jedoch als Zeichen der akuten Überdosierung, wobei hier das Zittern und die klonischen Zuckungen evtl. als Zeichen einer sich ankündigenden Schädigung des Zentralnervensystems aufzufassen sind. Ich erinnere hierbei an das im Kapitel Injektionsgeschwindigkeit Gesagte, an die Beobachtungen Stefans, weiter an die von Schumacher und Adler viermal sowohl beim Einschlafen, als auch beim Erwachen beobachteten schweren Erregungszustände, für die ich zu schnelle Injektion verantwortlich machen zu können glaubte. Nach der Ansicht von uns bestehen hier natürlich auch Zusammenhänge mit der Verwendung von Konzentrat, wobei ja auch Petermann ein gehäuftes Auftreten postnarkotischer Krampfanfälle beobachtete.

Weiter spielt bei den soeben erwähnten Kranken auch die psychische Komponente eine nicht in Abrede zu stellende Rolle, weiter die Nervosität dieser Patienten. Meder rät, Patienten mit

hochgradiger Nervosität überhaupt von der Evipan-narkose auszuschalten, da er in zwei Fällen bei übernervösen Patienten bei 8 bis 10 ccm Evipan oberflächliche Atmung, dann für 10 Minuten völligen Atemstillstand beobachtet hat. In diesem Fall bewährte sich Kohlenäure glänzend, denn bei Fortlassen derselben setzte die Atmung wieder aus; 10 Minuten hiernach waren die Störungen behoben.

Weiter ist nach S t a m m bei allen Erkrankungen des Zentralnervensystems (auch bei Hirntumoren und allgemeiner Karzinomatose) Vorsicht geboten, wegen der Unübersichtlichkeit der Reaktionen von Atem- und Gefäßzentrum.

Daß sich bei hochgradigen Stoffwechselstörungen die Evipan-narkose verbietet, dürfte ja klar sein. L a n g s t e i n e r betrachtet sie auch als Kontraindikation; S t i m p f l hat über Todesfälle bei Thyreotoxikose und schwerem Diabetes berichtet.

Eine weitere Kontraindikation ist in fieberhaften Erkrankungen, Sepsis, septischem Abort, Peritonitis etc. auf Grund der Literaturangaben zu sehen. Wir selbst haben allerdings in fieberhaften Erkrankungen nie eine Kontraindikation gesehen, auch nie bei solchen Erkrankungen Zwischenfälle infolge Evipan-Verabfolgung erlebt. A n f c h ü t z aber führt an, daß P e t e r m a n n über einen Todesfall bei einer 24jährigen Patientin mit fieberhaftem Abort bei 4,5 ccm Evipan berichtet. Er hat bei Peritonitis mit 2 und 3 ccm schwere Kollapse beobachtet. R e d m a n n berichtet einen Fall von W e e f e, wo bei einer Abrasio wegen septischem Abort nach Verabfolgung von 5 ccm Evipan der Exitus erfolgte. Hierzu kommt der in der Geburtshilfe bereits behandelte Todesfall an akuter Hepatose bei bestehender Infektion, sowie die vier Todesfälle von K i l l i a n, S c h m ö r l und die zwei Fälle von S c h m i d t bei bestehender Infektion, weshalb H o l t e r m a n n jetzt auch bei akuten Infektionen Evipan als zu gefährlich ablehnt. Weiter sah O h l i g m a c h e r einen schweren Kollaps bei einer Patientin mit hohem Fieber infolge Mastitis, die 10 ccm Evipan in 2¹/₂ Minuten erhielt. Eine Minute später erfolgte Kollaps mit Pulslosigkeit und Atemstillstand. Nach 3 ccm Coramin Wiederkehr des Pulses, während die Atmung erst nach 6 Minuten und vorausgehender künstlicher Atmung wiederkehrte. Es folgte ein Nachschlaf von zwei Stunden. — Meiner Ansicht nach dürfte jedoch

hier wieder einmal eine akute Überdosierung vorliegen, und Ohligmacher hat Recht, wenn er annimmt, daß eben fieberhaft erkrankte Patienten eine geringere Evipandosis benötigten und einen weiteren Fall anführt, in dem er bei einer an Sepsis post abort. erkrankten Patientin mit nur $1\frac{3}{4}$ ccm Evipan eine voll ausreichende Narkose erzielte. Stephan erwähnt nun noch einen lebensbedrohlichen Herz- und Kreislaufkollaps bei Abort. subfebrilis mens II, den man ja auch mit einer bestehenden Infektion in Verbindung bringen könnte. Diese Zwischenfälle bei bestehender Infektion bestätigen die Versuche Storms, der im Tierversuch nachwies, daß hochgradig septische Tiere mehr gefährdet waren als gesunde.

Es taucht einem unwillkürlich bei den Berichten über die Zwischenfälle bei Abort der Gedanke auf, ob nicht das häufige Ausgeblutetsein dieser Patienten oder der geschwächte Allgemeinzustand als auslösendes Moment zu betrachten ist. Denn geschwächter Allgemeinzustand kommt auch bei Infektionen mit in Betracht. So sah Köhler einmal einen schweren Kollaps bei einer ausgebluteten Patientin mit Abort. Auch Meder rät, die Evipannarkose bei ausgebluteten, kachektischen oder sonst schwer reduzierten Patienten auszuschalten. Frigyesi sieht in hochgradiger Blutarmut eine Kontraindikation, wobei man ja nun noch nicht weiß, ob er hierunter eine sekundäre Anämie verstanden haben will. Jedenfalls Einfluß auf die Hämoglobinwerte hat Evipan nicht, da Deinhardt diese trotz blassen und gelblichen Aussehens der Patienten immer normal und unbeeinflusst fand. Ferner sieht Liffard im schlechten Allgemeinzustand eine Kontraindikation; Frigyesi, Langsteiner und Meder auch in Kachexie.

Nach dem Bericht Bodens sind weiter in entzündlichen und stenosierenden Prozessen des Mundes und der Atemwege Kontraindikationen für die Evipananwendung zu sehen. Diese Zwischenfälle habe ich jedoch bereits im Zusammenhang mit meinem Hinweis auf die Wichtigkeit des Kieferhaltens während der Evipannarkose erwähnt und weiter berichtet, daß man nach Baetzner in England an Glottiskrampf bei den beschriebenen Halsphlegmone-Todesfällen glaubt, und dort die Einführung eines Nasentrachealkatheters bzw. die Intubation oder Tracheotomie als Gegenmaßnahme in derartigen Fällen empfohlen hat. Keufenhoff glaubt

die Erklärung für derartige Zwischenfälle in dem Auftreten eines Glottisödems zu sehen, womit bei Operationen entzündlicher Prozesse am Hals immer gerechnet werden müßte.

Als Letztes kommt nun noch die Anwendung der Evipan-narkose bei Asthma, die sich nach Stimpfl ebenfalls verbietet. Feldweg sah nämlich eine schwere Atemlähmung bei Asthma nach Injektion von nur 3 ccm Evipan. Unmittelbar vorausgegangen war allerdings ein heftiger Asthmaanfall, der möglicherweise durch 50 ccm $\frac{1}{2}\%$ ige Novocain-Suprareninlösung verursacht war. Auch Deinhardt sah bei einer Asthmaticerin Cyanose und Atemstillstand, der durch Lobelin sofort behoben werden konnte. — Da nun das Asthma zu den allergischen Krankheiten gehört, halte ich diese Zwischenfälle für ein Zeichen einer evtl. doch bestehenden Idiosynkrasie gegen Evipan, worauf ja wohl auch die zwei Fälle von Daners und Pohl, wo eine Urtikaria nach Evipan — einmal sogar nach vorausgegangener Cyanose und kleinem Puls während oder kurz nach der Injektion — aufgetreten war, hinzudeuten scheinen. Wenn also in der Literatur an zahlreichen Stellen erwähnt wird, es gebe keine Idiosynkrasie gegen Evipan, so muß ich sagen, daß es meiner Ansicht nach also doch eine Idiosynkrasie gegen Evipan gibt, und diese scheint mir die wenigen bisher weder durch Übersehen einer Kontraindikation, Überdosierung, falscher Narkosemethodik etc. erklärten Zwischen- und Todesfälle aufzuklären! Ich möchte daher der Ansicht zuneigen, der Vorsicht halber Evipan bei nachgewiesener Neigung zu allergischen Erkrankungen oder beim Bestehen solcher Krankheiten, lieber fortzulassen.

Kurz die bisher erwähnten Todes- und Zwischenfälle überblickend sind als kontraindiziert oder gefährlich zu erachten:

1. Falsche Narkosemethodik und Überdosierung wie:
Verabfolgung von Hypnotica und Sedativa vor der Narkose.
Schematische oder zu hohe Dosierung.
Verabfolgen einer zu hohen Evipandosis bei der Evipanstartnarkose.
Evipanchloroformstartnarkose.
Protrahierte Evipannarkose.
Schnelle Injektion.
Injektion ohne genügendes Hilfspersonal (Cave prakt. Arzt).

2. Evipanverabfolgung vor erwarteter Lebendgeburt, evtl. überhaupt die Evipanverabfolgung in der Geburtshilfe.

3. Evipananwendung bei Krankheiten wie:

Leberleiden (Leberschädigung, ungenügende Leberfunktion, akute Hepatose, akute gelbe Leberatrophie, Leberinsuffizienz, Leberparenchymschäden, Icterus etc.)

Eklampsie und Präeklampsie.

Nierenschädigungen (Nierenveränderungen, Nephropathie).

Infektion (Sepsis, septischer Abort, Peritonitis, Ileus, Mastitis, hohes Fieber etc.).

Kyphoskoliose.

Herzkrankheiten (Herzschädigungen, Herzfehler, insbesondere dekompenzierte Herzfehler).

Hohes Alter.

Kreislaufstörungen (Arteriosklerose, Hypertension, Vagotonie).

Schlechter oder reduzierter Allgemeinzustand und Kachexie.

Erkrankungen der Schilddrüse (Basedow, Thyreotoxikose).

Stoffwechselstörungen (Diabetes etc.).

Hochgradige Nervosität und psychische Alteration.

Erkrankungen des Zentralnervensystems.

Anämien.

Entzündliche und stenosierende Prozesse des Mundes und der Atemwege (Parulis, Mundbodenpflegmone, alte Tracheotomie-narben).

Allergische Krankheiten (Asthma etc.).

Hierbei zu unterscheiden zwischen bedingten und unbedingten Kontraindikationen ist unmöglich. Man kann nur eins sagen: Die Evipananwendung ist bei den vorliegenden Verhältnissen und unter den vorliegenden Umständen nicht unbedenklich, evtl. sogar gefährlich, wenn nicht kontraindiziert. Der Übergang von einem zum anderen ist dabei fließend, besonders beim Hinzutreten unglücklicher sonstiger nicht vorausgesehener oder vorauszufehender Umstände.

Es genügt m. E. vollständig, daß bei Vorliegen dieser Gegebenheiten Todes- und Zwischenfälle vorgekommen sind, von denen ich zahlreiche als Beispiele erwähnt und näher erläutert habe.

Die ernststen Störungen und Nebenwirkungen bestanden in Einflüssen auf das Zentralnervensystem, wie langer Nachschlaf, kloni-

fche Zuckungen, schwere krampfartige Zustände, Erregungszustände, Schreikrämpfe, Doppelsehen, Würgen, Erbrechen etc.; Störungen der Herztätigkeit und des Kreislaufs bis zum Stillstand, Blutdrucksenkungen, Störungen der Atmung bis zum Stillstand und zur Asphyxie, Asphyxie von Kindern, Einflüssen auf den Uterus, vom Geburtsstillstand bis zur Nachgeburtsverzögerung mit Ausschaltung oder Beeinträchtigung der Wehentätigkeit, der Wehenintensität, der Bauchpresse und Verursachung von Nachgeburtsblutungen und Nachblutungen.

An ungefährlichen Störungen und Nebenwirkungen sind zu nennen: Blässe, Gesichtsrötung, conjunctivale Injektion, schlechte Entspannung der Bauchdecken, Urtikaria, Unruhe, Weinen, Zittern und harmlose Zuckungen.

Beim Vergleich mit den zahlreichen guten Eigenschaften des Evipans fielen bei unseren Evipannatriumnarkosen die unerwünschten Nebenerscheinungen als kaum nennenswert und nur äußerst selten ins Gewicht. Der Todesfall bei Eklampsie und der Tod der rachitischen Patientin mit dekompensiertem Herzfehler und Nierenschädigung ist aus früher dargelegten Gründen unmöglich der Evipannarkose zur Last zu legen; ein Evipantod ist an unserer Klinik nie erfolgt.

Die bei uns beobachteten Nebenerscheinungen sind zahlenmäßig aus folgender Tabelle, die sich auf 500 genau kontrollierte Narkosen bezieht, ersichtlich.

Harmlose Nebenwirkungen:

Conjunctivale Injektion	8
Auffallende Blässe	11
Auffallende Gesichtsrötung	11
Müdigkeit	15
Lebhaft Reflexe	4
Enge reagierende Pupillen	2
Singultus	2
Schlechte Entspannung der Bauchdecken . . .	12
Unruhe	13
Weinen	3
Würgreiz	4
Zittern und Zuckungen	35

Gefährlichere Nebenwirkungen:

Babinskisches Zeichen	1
Cyanofo	1
Desorientierung	1
Doppelsehen	1
Erbrechen	20
Erregungszustand	1
Kopfschmerzen	10
Langer Nachschlaf (über 2 Std.)	3
Kleiner Puls	8
Weite nicht reagierende Pupillen	28
Schreien	1
Schwindel	1
Übelkeit	3
Krampfartige Erscheinungen	2
Vorübergehende Asphyxie von Neugeborenen	3

Ich möchte jedoch zu der Einteilung der bei uns beobachteten Evipannebenwirkungen bemerken, daß eine scharf umgrenzte Einteilung in harmlose, gefährlichere und gefährliche Nebenwirkungen sich nur sehr schlecht durchführen läßt, da auch hier die Abstufung der einzelnen Nebenwirkungen keine scharfe, sondern eine ineinanderübergehende ist.

Die Anwendung von Weckmitteln etc. erübrigte sich bei uns vollkommen bis auf die 3 Fälle von vorübergehender Asphyxie von Neugeborenen, wobei wir Cardiazol, Lobelin, Wechselbäder und künstliche Atmung als Gegenmittel verwendeten.

In der Literatur sind, wie wir bereits sahen, bei den Atem-, Herz- und Kreislaufstörungen die ausnahmslos Erwachsene betrafen, künstliche Atmung, Anwendung des Pulmotors, Sauerstoff- und Kohlenäureverabfolgung, Injektionen von Lobelin, Cardiazol, Campher, Coramin, zum Teil in hohen Dosen und intravenös empfohlen worden, weiter schienen einmal eine intracardiale Adrenalininjektion, sowie eine Koffeininjektion suboccipital in die Cisterna cerebello-medullaris, erfolgreich gewesen zu sein. Zur Nachbehandlung wurden Lichtbügel, Traubenzuckerinfusion und Symptolgaben verabfolgt.

Dem mit der Evipannarkose noch nicht Vertrauten könnte nun angst und bange werden, besonders auf Grund der aus der Literatur zusammengetragenen und daher gehäuft erscheinenden Komplikationen. Leider war es mir wegen der teilweise recht ungenauen oder fehlenden Angaben nicht möglich, festzustellen, auf wieviel Narkosen sich die in der Literatur beschriebenen Zwischenfälle beziehen. Bei Sichtung der Fälle aber ergibt sich, daß sich die meisten Zwischenfälle und unangenehmen Begleitererscheinungen auf mangelhafte Narkosetechnik und -methodik, wie Überdosierung, zu schnelle Injektion, Einspritzen nicht völlig gelösten Evipannatriums, Verwendung von Evipannatriumkonzentrat, überhaupt Nichtbeachtung von Kontraindikationen zurückführen lassen. Es bleiben dann nur einige wenige ungeklärte Fälle übrig, die man evtl. mit dem Bestehen einer Idiosynkrasie gegen Evipan erklären könnte. Daß die Evipanzwischenfälle tatsächlich nicht so häufig sind, geht aus den verschiedensten veröffentlichten Zusammenstellungen hervor. So sagt A n f c h ü t z : In Zusammenstellung von 5200 Narkosen in 16 Serien gab es keinen ernstern Zwischenfall, während in den restlichen sieben Serien mit etwa 1300 Fällen über sieben Atem- und Kreislaufstörungen berichtet wird, von denen vier schwerer Natur waren. Es handelte sich meist um relative, in einigen auch um absolute Überdosierung und bedeutet daher keine Belastung für Evipan, sondern der Narkosemethodik. Todesfälle waren unter 6500 nur 4. Die Zwischenfälle sind daher nicht geeignet, die weitere Entwicklung der Evipannarkose aufzuhalten. Frigyes i sagt: In Ungarn befanden sich unter ungefähr 12 000 veröffentlichten Evipannarkosen 4 Todesfälle, was der Weltliteratur entspricht, wo auf 100 000 Evipannarkosen 29 Todesfälle kommen. B a e t z n e r sagt: Nach der Statistik der I.G. beträgt die Zahl der angeschuldigten, bzw. sicheren Todesfälle 60 auf 1,5 Millionen Evipannarkosen. Ein größeren Teil beruht in Irrtümern in der Dosierung. B a e t z n e r selbst aber hat bei 2000 eigenen Narkosen keinen Todesfall erlebt, wir bei jetzt etwa 4000 eigenen Fällen. Dazu kommt noch, daß natürlich Zwischenfälle leichter Anlaß zur Veröffentlichung geben, als gute Erfahrungen, zumal, wenn diese schon in großer Zahl vorliegen und selbst bei den Veröffentlichungen über Zwischenfälle immer wieder betont werden. Überhaupt ist es in letzter Zeit mit Veröffentlichungen über Evipanzwischen-

fälle recht still geworden. Ich habe 1936 überhaupt keinen ersten Zwischenfall in der Literatur mehr feststellen können. Ich vermute daher, daß jetzt die Evipannarkose aus den „Flitterwochen“ herausgekommen ist, d. h., daß alle diejenigen, die sie anwenden, inzwischen Erfahrungen gesammelt haben und vorsichtiger in der Dosierung, einschränkender in der Anwendung bei schweren Krankheiten geworden sind, zumal jetzt ja auch die Mehrzahl der Kontraindikationen bzw. Vorichtsindikationen allgemein bekannt sind. Zur gefahrfreien Verwendung der Evipannarkose gehört eben Erfahrung, und diese hat sich nur nach großer Übung und auf Grund von Mißerfolgen sammeln lassen. Erfahrungen auf diesem Gebiet aber haben die meisten gesammelt. Daher verwirft auch keiner die Evipannarkose völlig, nur hat der eine oder andere aus diesem oder jenem Grunde die Evipananwendung beschränkt. Die Mißerfolge haben sich meist aus einer gewissen Unerfahrenheit bei den ersten Versuchen ereignet, was auch meistens zugegeben wird. Es wäre ja auch sonst merkwürdig, daß selbst diejenigen Evipanolben, die Todes- und Zwischenfälle selbst erlebt und beschrieben haben, und zu verwundern, warum sie die Evipannarkose nicht längst verlassen haben. Alle haben eben eingesehen, daß sie Fehler gemacht haben, daß aber die Evipannarkose an sich durchaus brauchbar ist, ja sogar eine wesentliche Bereicherung der brauchbaren Narkosemöglichkeiten darstellt. Nur so ist der Siegeszug des Evipans zu erklären. Es wäre daher angebracht, jetzt einen großen Strich unter das Geschehene zu ziehen und dann später zu untersuchen, wieviel Zwischen- und Todesfälle sich bei der verfeinerten Evipannarkosetechnik und -methodik noch ereignen, wie sich Mortalität und Morbidität verhalten, und in welchem Verhältnis diese Ergebnisse zu den Resultaten bei den anderen gebräuchlichen Narkosearten stehen. Als Beweis für die Richtigkeit dieser Ansicht mögen die guten Erfolge derjenigen dienen, die vorsichtig in der Auswahl der für die Evipannarkose geeigneten Fälle waren, sich eine vorsichtige Technik angeeignet haben und die Evipannarkose nur auf ausgesprochen kurz dauernde Eingriffe beschränkt haben.

So haben die Beobachtungen an der Universitäts-Frauenklinik in Bonn ergeben, daß die allgemeine Wirkung bei sämtlichen 1200 Narkosen eine voll befriedigende war.

Nur 164mal gaben wir Zusätze zur Evipannatriumnarkose und zwar: 157mal Äther, 1mal Chloroform, 1mal Morphin, 1mal protrahierte Evipannarkose, 1mal Infiltrationsanästhesie, 2mal parametrane Anästhesie und 1mal Pudendusanästhesie.

Wir erhielten bei 1200 Narkosen:

voll ausreichende Narkosen		1035
zum Teil genügende Narkosen		35
schlechte Narkosen		12
ungenügende Narkosen		12
Verfager (paravenöse Injektion)		1

In wie weit überhaupt die weniger befriedigenden Narkosen auf eine teilweise paravenöse Injektion zurückzuführen sind oder auf die Verwendung von Evipannatriumkonzentrat als Ausgangsmaterial zur Herstellung der 10%igen Lösung, läßt sich natürlich sehr schlecht feststellen.

Unter den vorhin erwähnten 164 Fällen waren aber Zusätze infolge mangelhafter Narkose nur 24mal erforderlich. In den übrigen 105 Fällen war eine längere Dauer des Eingriffs und hiermit auch der Narkose vorauszusehen.

Es wurden demnach bei 1200 Evipannarkosen ausgeführt:

Ätherzusatznarkosen infolge mangelhafter Narkose		24
Ätherzusatznarkosen infolge zu langer Dauer der Operation		92
Evipanätherstartnarkosen zu Versuchszwecken		6
Evipanchloroformstartnarkosen zu Versuchszwecken		1
Protrahierte Evipannarkosen (einmalige Nachinjektion) zu Versuchszwecken		1
Vorbereitung der Evipannarkose mit Morphin zu Versuchszwecken		1
Evipanvoratznarkosen bei Lokalanästhesie		4

Mit letzteren wurden ausgeführt:

Infiltrationsanästhesie der Haut		1
Parametrane Anästhesie		2
Pudendusanästhesie		1

Einen eigentlichen Verfager haben wir nicht, denn daß bei paravenöser Injektion keine Narkosewirkung eintritt, ist ja verständlich. Im Schrifttum sind aber solche Verfager mehrfach be-

schrieben. Sie beruhen wohl auch vielleicht zum Teil auf völliger oder teilweiser paravenöser Injektion, auf Unterdosierung, evtl. auch auf erhöhtem Grundumsatz und anderen unbekannten Faktoren. — So sah Stephan 6 völlige Verfägar; Vogt 3 Verfägar, hierunter aber 2 bei inoperablem Ca, wobei er mit Rücksicht auf mögliche Leberveränderungen mit der Dosierung vorsichtiger war, in dem anderen Fall waren die Gründe unklar. Ar del t beobachtete einen Verfägar bei essentieller Hypertonie von 200 mm Hg, wo nach 10 ccm Evipan sich noch nicht einmal Müdigkeitserscheinungen einstellten, der Blutdruck jedoch um 30 mm Hg gesenkt wurde, wofür er keine Erklärung hat. An f ch ü t z sah in zwei bis fünf Prozent seiner Fälle Verfägar, am häufigsten bei jugendlichen Personen zwischen 15 und 30 Jahren bei einem Körpergewicht von 60 bis 75 kg, wobei er unter Verfägar, wie bereits erwähnt, die zu geringe oder völlige Unwirksamkeit von 10 ccm Evipannatrium versteht.

Bei der paravenösen Injektion wurde von uns die gute lokale Verträglichkeit des Evipans als besonders angenehm empfunden, verursachte sie doch keinerlei nennenswerte Beschwerden, auch ging das Infiltrat nach kurzer Zeit spurlos zurück. Thrombosierungen von Gefäßen traten nicht ein.

Eine von uns versuchsweise vorgenommene intramuskuläre Injektion ließ jegliche Narkosewirkung vermissen. Auch hier hinterließ die Injektion keinerlei nachteilige Folgen. Die intramuskuläre Injektion scheint nur eine sedative Wirkung zu besitzen.

Die Harmlosigkeit der lege artis vorgenommenen Evipanarkose beweist neben den zu Anfang meiner Arbeit gestreiften pharmakologischen und physiologisch-chemischen Untersuchungen das Verhalten von Kreislauf, Atmung, Reflexen, etc., während der meisten Narkosen.

Das Aussehen der Patienten war während der Narkose meist ohne irgendwelche Besonderheiten. Unter den ersten 500 Fällen sahen wir nur, wie bereits erwähnt, je 1mal auffallende Blässe oder Gesichtsrötung auftreten. Die Blässe mutete den mit der Evipanarkose noch Unvertrauten, im Anfang etwas unheimlich an, da der Schlaf dadurch etwas Totenähnliches bekam, ohne daß Gefahr vorlag. Es ist interessant zu hören, daß De i n h a r d t des-

halb die Hämoglobinwerte untersuchte, diese aber trotz blaffen und gelblichen Aussehens immer normal fand.

Die Atmung veränderte sich während der Injektion nur unwesentlich. Der Narkosebeginn zeigte sich in ein oder zwei langsamen und tiefen Inspirationen an, hierauf wurde die Atmung wieder etwas oberflächlicher und beschleunigter, um alsbald in einen tiefen Schlafrhythmus überzugehen. Eine Steigerung der Atemfrequenz trat nicht ein, was auch von anderen Untersuchern bestätigt wird.

In 10 Fällen wurde von mir der Blutdruck vor und während der Narkose untersucht und stellte ich hierbei regelmäßig eine Blutdruckverminderung fest, die zwischen 10 und 20 mm Hg. systolisch und diastolisch schwankte. Bei einer älteren Patientin mit einem Blutdruck von 170/140 mm Hg trat jedoch eine Senkung um 40 mm Hg ein. Etwas ähnliches hat ja auch *Ardelt* berichtet, der bei einer Patientin mit essentieller Hypertonie von 200 mm Hg eine Senkung um 30 mm Hg erlebte, was ich bereits im Vorhergehenden erwähnte. *Deinhardt* sagt, der Blutdruck sinkt durchschnittlich um 20 mm Hg. *Gocke* erwähnt, daß fortlaufende Blutdruckmessungen ein Absinken des Blutdrucks um 15 bis 25 mm Hg in den ersten 5 bis 10 Minuten ergaben. In 5 Fällen (von 160) jedoch sank der Blutdruck bis zu 40 mm Hg ab, in einem Falle um 50 mm Hg, bei dieser Patientin lag jedoch *Basedow* mit Blutdrucksteigerung von 150 mm Hg vor. Im Tierversuch erwies sich ihm die Veränderung des Blutdrucks als abhängig von der Injektionsgeschwindigkeit. Die Blutdrucksenkung hielt 12 bis 20 Minuten an, nach 20 bis 30 Minuten hatte der Blutdruck seinen Ausgangswert wieder erreicht oder war etwas erhöht. *Castro* sagt, eine Blutdrucksenkung tritt nicht oder nur kaum ein, vielmehr zeigt der Blutdruck 2 Minuten nach Narkosebeginn eine ansteigende Tendenz, die Werte aber sind gering und nicht beunruhigend. *Schulz* dagegen sagt, der Blutdruck zeigte im Gegensatz zu anderen Publikationen kein einheitliches Verhalten. Ungefähr die Hälfte zeigte Blutdruckerhöhung um 5 bis 35 mm Hg, die andere Hälfte Senkung um 10 bis 50 mm Hg unmittelbar nach der Injektion; 10 Minuten später bestand fast regelmäßig eine geringe Senkung des arteriellen Druckes. Auch Patienten mit erhöhtem Blutdruck zeigten dieselbe Reaktion. Dabei injiziert er den ccm in $\frac{1}{2}$ bis 1

Minute und dosiert nach der Einschlafzeit — injiziert also bedeutend langsamer als sonst allgemein üblich. Stefan sagt, allzurasche Injektion führe zur Blutdrucksenkung. Ebenso warnt Esch vor rascher Injektion, da sonst Blutdrucksenkung eintrete, wie Dr. Gocke im Tierexperiment nachweisen konnte. Storm stellte bei langsamer Injektion bei Affen eine Herabsetzung des Blutdrucks fest und eine Unterdrückung der Reflexreizbarkeit, während alle Funktionen des Organismus sonst unverändert blieben. Reizung eines sensiblen Nerven rief Blutdrucksteigerung hervor. Anders bei zu schneller Injektion. Blutdruck und Atemfrequenz sinken rasch ab und es ist möglich, daß bei zu rascher Injektion großer Dosen der Tod eintreten kann. Über die Ursachen sind Untersuchungen noch im Gange. — Am meisten Klarheit in das Verhalten des Blutdrucks während der Evipannarkose haben die Untersuchungen Rüders gebracht, der mit dem Autotonographen nach Lange Blutdruckkurven während der Evipannarkose aufgenommen und so jede subjektive Beobachtung und Kurvenausdeutung ausschaltet. So sank z. B. bei einer Patientin der Blutdruck diastolisch um 10 mm und systolisch um 10 bis 15 mm Hg. Bei einer zweiten Patientin sank bei einer Curettage mit 7,5 ccm Evipan der Blutdruck abermals um 10 bis 15 mm Hg. — Diese Blutdrucksenkungen sind also nicht ernst zu nehmen, da eine Senkung um 15 bis 30 mm Hg ungefähr der des natürlichen Schlafes entspricht.

Der Puls blieb während der Narkose kräftig, er war bei unsern Beobachtungen jedoch meist um 10 bis 30 Schläge pro Minute erhöht. Ausgesprochen klein war der Puls nur in 8 Fällen. Schulz beobachtete auch nur geringe Frequenzerhöhung. Gocke fand ebenfalls die Pulsfrequenz gewöhnlich um 20 bis 30 Schläge erhöht, in einem Fall um 50- aber in allen Fällen (160) genügend gespannt. Die Pulsveränderungen hielten seiner Ansicht nach entsprechend den Blutdruckveränderungen an.

Die Reflexe schienen im allgemeinen zu verschwinden, in einem Teil der Fälle aber nicht beeinflußt zu werden, viermal sahen wir lebhaftere Reflexe, einmal Babinskisches Phänomen während der Narkose auftreten. Dieses unterschiedliche Verhalten scheint an der verschiedenen Narkosetiefe zu liegen. Anschütz sagt, die meisten Autoren berichten, daß die Bauchdeckenreflexe noch vor oder wenigstens gleichzeitig mit den Reflexen der unteren Extremi-

täten verlöschen, was einen großen Vorteil bedeutet. Bei der Raufch-narkose, wie sie z. B. S p e c h t zur Zahnextraktion benutzt, tritt kein Verschwinden der Reflexe ein. Das Verschwinden der Reflexe muß noch genauer studiert werden, insbesondere kann man sich auf die Pupillenreaktionen nicht verlassen. Wir selbst fanden die Pupillen meist nur gering und träge reagierend, sie waren weit bis mittelweit, zweimal waren sie auffallend eng, reagierend, 28mal auffallend weit und nicht reagierend. Das Erlöschen der Pupillenreaktionen scheint jedoch bei der Evipannarkose kein alarmierendes Zeichen zu sein. Die Cornealreflexe waren während der Narkose meist erloschen. D e i n h a r d t fand ebenfalls die Reflexe, auch die Cornealreflexe, erloschen, die Pupillen aber ganz schwach reagierend. A r d e l t sagt, die Pupillen reagieren auf Licht; er machte weiter die Beobachtung, daß die Pupillen stets oval entrundet sind, und zum limbus corneae etwas exzentrisch liegen. Die Pupillenverziehung verschwand allmählich unter Nachlassen der Narkose. S t a m m sagt, das Verhalten der Reflexe in der Evipannatriumnarkose wird nicht einheitlich beschrieben. Die ersten Reflexe, die ausfallen, sind, wie schon häufig erwähnt, der Kieferreflex, Conjunctival- und Bauchdeckenreflex. Es folgen danach die übrigen peripheren Reflexe. Am längsten bleibt der tiefe Peritonealreflex erhalten. Schon vor Eintritt der tiefen Narkose sind Corneal- und Lidreflex abgeschwächt, bei voller Narkose fallen sie aus. Die Pupillen verengern sich zunächst und erweitern sich bei voller Narkose, reagieren aber noch deutlich. Erst bei tiefer Vollnarkose wird die Reaktion träge oder verschwindet, sie werden dann weit, aber die Größe ist nicht einheitlich. Bei der Evipannatriumnarkose sind die Pupillen meistens wesentlich weiter, als bei der Äthernarkose und erweitern sich mit zunehmender Tiefe der Narkose. Die Pupillenweite ist also kein Alarmsignal.

Beim Aufwachen, was meist nach 15 bis 25 Minuten erfolgte, bestand stets völlige Amnesie für Schmerzeindrücke jeglicher Art. Selbst in Fällen, wo deutliche Abwehrbewegungen, ja sogar lautes Schreien am Ende der Operation aufgetreten waren, hatten die Patienten hierüber später keinerlei Vorstellungen mehr.

Nach dem endgültigen Erwachen trat stets ein Nachschlaf von etwa einer halben bis zwei Stunden auf, dreimal beobachteten wir längeren Nachschlaf, hierunter, wie bereits erwähnt, einen solchen

von 17 Stunden, was wohl als Zeichen von Überdosierung aufzufassen ist, in der Literatur werden ähnliche Beobachtungen gemacht.

Wenn auch nach der Narkose hin und wieder psychische Depression, Abgeschlagenheit und Müdigkeit in einigen wenigen Fällen vorkam, sehr selten auch Erbrechen, so muß hierzu bemerkt werden, daß es sich dann auch meist um psychisch labile und aufgeregte Patienten gehandelt hatte und daß insbesondere das Erbrechen viel weniger häufig als nach Inhalationsnarkosen vorkam, wodurch man meistens sogar in der Lage war, besonders ausgebluteten Patienten schon kurz nach der Narkose Flüssigkeit zuzuführen. In der Regel aber waren die Kranken nach dem Erwachen mit der Narkose sehr zufrieden, vor allen Dingen äußerten sie sich sehr lobend über das leichte unmerkliche Einschlafen; jegliches Angstgefühl vor Eintritt der Narkose fehlte. Besonders Patienten, die bereits früher einmal eine Inhalationsnarkose mitgemacht hatten, äußerten sich meist spontan über die schonende Art der Narkose und betonten, daß sie vorzüglich geschlafen oder geträumt hätten und sich völlig wohl befänden.

Ich bin der Ansicht, daß die guten Eigenschaften der Evipannatriumnarkose, wie ihre schnelle Wirksamkeit, die psychische Schonung der Patienten, das subjektiv Angenehme des Einschlafens, das meist völlige Wohlbefinden beim Erwachen, ebenso wie das meist fehlende Erbrechen bei weitem überwiegen, weshalb auch die meisten Autoren das Evipan wegen seiner Vorteile für Patienten und Arzt im klinischen Betrieb nicht mehr missen wollen. Ich halte jedoch die intravenöse Narkose für den praktischen Arzt für ungeeignet, es sei denn, er verfügt über geeignetes Hilfspersonal und über größere Erfahrungen auf diesem Gebiet. Evipan dürfte sich aber in der Sprechstundenpraxis schon wegen des verhältnismäßig langen Nachschlafs verbieten. Auf Grund meiner Erfahrungen aus Literatur und Praxis möchte ich mich im großen und ganzen mit kleinen Abänderungen den Worten *H o l t e r m a n n s* anschließen und sagen: Evipan ist in geeigneter Dosierung ein weitgehend unschädliches Mittel mit hoher, aber begrenzter Leistungsfähigkeit, das im klinischen Betrieb bei großer psychischer Schonung und einfacher Anwendung für kurzdauernde Narkosen im allgemeinen ohne Zusatznarkose ausreicht und sich bei ausgesprochen kurz dauernden Eingriffen durchweg bewährt hat. Die Evipannatrium-

narkose ist berufen, infolge einfacher Handhabung unsere bisherige Narkosetechnik zu vereinfachen. Sie beginnt bei Kurznarkosen, die bisher üblichen Narkoseverfahren mehr und mehr zu verdrängen.

Die Erfahrungen mit Evipannatrium an der Universitäts-Frauenklinik, Bonn, waren bei 1200 Narkosen recht gute, es sind bei den inzwischen insgesamt ausgeführten etwa 4000 Narkosen keine nennenswerten Zwischenfälle vorgekommen. Bei Beobachtungen der Kontraindikationen, sowie bei vorsichtiger Narkosetechnik und Dosierung, sind keinerlei Schädigungen oder Zwischenfälle zu erwarten. Die in der Literatur beschriebenen Zwischenfälle lassen sich mit Sicherheit bei Beachtung der in meiner Arbeit erwähnten Regeln vermeiden. Die Feststellung, daß Evipan bei schweren Allgemeinerkrankungen kontraindiziert ist, stellt etwas Bedauerliches dar, ist aber nichts Besonderes, da sich bei derartigen Erkrankungen auch andere Narkosearten entweder verbieten oder jedenfalls auch gefährlich sind. Der Rat Evipan in der Geburtshilfe bei erwarteter Lebendgeburt zu vermeiden, ist leicht zu befolgen, da eine Narkose bei normaler Geburt überhaupt überflüssig ist; in der operativen Geburtshilfe muß man eben die Evipannarkose bei erwarteter Lebendgeburt durch eine Inhalationsnarkose, einen Raufsch etc. ersetzen. Ich möchte auf Grund der Erfahrungen an der Universitäts-Frauenklinik Bonn und auf Grund meiner Kenntnis des geburtshilflich-gynäkologischen Evipanschrifttums das Evipannatrium für den Gynäkologen als das Kurznarkotikum der Wahl bezeichnen.

Zusammenfassung.

Meine Arbeit — Erfahrungen mit dem Kurznarkotikum Evipannatrium — überblickend, kann ich sagen, es wurde auf Grund meiner Untersuchungen und Erhebungen der Versuch unternommen, die Erfahrungen an der Universitäts-Frauenklinik Bonn mit Erfahrungen anderer Kliniken und Krankenhäuser zusammenzustellen und kritisch zu vergleichen, wobei insbesondere die geburtshilflich-gynäkologische Literatur eingehend berücksichtigt wurde.

Es wurden die pharmakologischen und physiologisch-chemischen Arbeiten über Evipannatrium kurz gestreift. Es folgte ein zeitlicher und zahlenmäßiger Überblick über die Evipannatrium-

narkose an der Universitäts-Frauenklinik Bonn und eine umfassende Zusammenstellung der ausgeführten Eingriffe, sowie eine Kennzeichnung des Anwendungsgebietes. Es wurde die Narkosetechnik genau besprochen und dabei bewiesen, daß nur eine langsame Injektion der Evipanolösung statthaft ist. Weiter wurde die Dosierung besprochen und festgestellt, daß nur eine elastisch-individuelle Dosierung auf biologischer Grundlage zum Ziele führen kann und daß jedes Schema als gefährlich abzulehnen ist. Es wurde auf die Wichtigkeit des Kieferhaltens während der Narkose hingewiesen, der normale Verlauf der Narkose geschildert und die Geeignetheit der Narkose für den Gynäkologen wegen der guten Bauchdeckenentspannung hervorgehoben.

Es folgte eine Besprechung der verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Evipannarkose, wobei die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit gegeneinander abgewogen wurde. Wegen der unterschiedlichen Bezeichnung der einzelnen Narkosearten wurde ein Vorschlag einer einheitlichen Nomenklatur unterbreitet, wobei das Unterschiedliche bei operativer und geburtshilflicher Evipananwendung berücksichtigt wurde.

Es kamen dann die Anwendungsmöglichkeiten in der Geburtshilfe zur Sprache, wobei die Nachteile und Vorteile eingehend besprochen wurden und schließlich an Hand geeigneter Fälle gezeigt wurde, daß die Evipananwendung in der Geburtshilfe bei erwarteter Lebendgeburt keineswegs unbedenklich wenn nicht sogar gefährlich ist. Es wurde darauf hingewiesen, daß die Universitäts-Frauenklinik Bonn auf Grund ihrer Erfahrungen die Evipannarkose in der Geburtshilfe bei erwarteter Lebendgeburt strikt ablehnt, da sie eine Schädigung der Neugeborenen durch Evipannatrium nachgewiesen zu haben glaubt.

Hierauf folgt eine Besprechung der Erfahrungen, die bei nicht ganz Körpergefunden und Kranken mit der Evipannarkose gemacht wurden. Es wird ein Weg zur Behandlung des unstillbaren Erbrechens Schwangerer gezeigt und weiter werden die guten Erfahrungen bei Tuberkulösen bei der Evipannarkose hervorgehoben. Die Evipannarkose wird bei Eklampsie und Präeklampsie als zu gefährlich abgelehnt und dies an einem Fall aus der Universitäts-Frauenklinik Bonn erläutert. Hieran reihen sich nach Krankheiten geordnet, zahlreiche, zum Teil ausführliche Berichte von ernststen Zwischen-

fällen und Komplikationen bei Anwendung der Evipannarkose an kranken Personen, woraus ersichtlich wird, bei welchen Krankheiten die Evipannarkose gefährlich oder kontraindiziert ist und mit welchen Mitteln man versucht hat, etwa auftretende Störungen und Zwischenfälle zu beseitigen. Gleichzeitig wurde die Frage aufgeworfen, ob Evipan nicht doch bei unzureichender Verwendung Leber- oder Nierenschäden hervorrufen kann.

In einem kurzen Überblick wurden dann die Punkte noch einmal aufgezeichnet, bei denen sich die Evipannarkose als gefährlich erwiesen hat. Es wurden noch einmal insgesamt die ersten Störungen und Nebenwirkungen sowie die ungefährlichen Störungen und harmlosen Nebenwirkungen aufgezählt und schließlich die bei uns beobachteten Nebenwirkungen zusammengestellt. Hierauf folgt eine Aufzählung der Maßnahmen und Medikamente, die geeignet erscheinen, etwaige Zwischenfälle zu beheben.

Nun folgt eine Darlegung der Gründe, weshalb die Zahl der Zwischenfälle so hoch erscheint und es wird an mehreren Zusammenstellungen aus der Literatur gezeigt, auf wieviel Narkosen sich die angeschuldigten bzw. sicheren Todesfälle verteilen. Es folgt nun das Ergebnis der Evipannatriumnarkosen an der Universitäts-Frauenklinik Bonn und eine Erläuterung der Ungefährlichkeit der Evipannarkose an Hand von angestellten Untersuchungen und Beobachtungen des Verhaltens der Körperfunktionen während der Narkose.

Zum Schluß erfolgt eine Würdigung der Evipannarkose auf Grund der vorliegenden Erfahrungen mit Evipannatrium.

Zum Schluß meiner Arbeit sei es mir vergönnt, Herrn Professor Dr. Haupt und Herrn Privatdozent Dr. Rupp meinen Dank für die gütige Anregung zu dieser Arbeit und die Überlassung des Themas auszusprechen.

Schrifttum.

- Ahrens, Zur Kurz- u. Basisnarkose mit Evipannatrium. (Med. Klin. 1935, Nr. 19).
- Anschütz: Die Kurz- und Raufchnarkose mit Evipannatrium. (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 34 und Arch. Klin. Chir. 177, 716).
- Ardelt: Diskussion (Zbl. 1933 Nr. 44).
- Baetzner, W.: Über eine neue intravenöse Narkose mit Evipannatrium (Dtsch. med. Wschr. 1933 Nr. 2).
- Die Evipan-Natrium-Narkose, Rückblick und Ausblick (Zbl. Gyn. 1935 Nr. 25 und Arch. Klin. Chir., Kongreßband 183).
- Bauks, K.: Erfahrungen m. d. injizierbaren Evipan-Natrium-Narkose, Zbl. Chir. 1933/306 und Zbl. Gyn. 1933, Nr. 15).
- Bauereisen: Aussprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48 u. 1934 Nr. 7).
- Benthin: Die jeweilig beste Narkoseart (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 33).
- Boden, O.: Kontraindikationen bei der Evipan-Natrium-Narkose (Fortchr. Ther. 9, H. 2).
- Asthma und Evipan. (Münch. med. Wschr. 1934, Nr. 11).
- Bortini, E.: Über Evipan-Natrium in der Geburtshilfe (Raff. Ostetr. 1934, H. 4).
- Buerkle de la Camp, H.: Über die Evipan-Natrium-Narkose (Dtsch. Z. Chir. 1934, 240/452).
- Caffier, P.: Intravenöse Schmerzausschaltung mit Evipan-Natrium (Zbl. Gyn. 1933/987).
- Canavero, G.: Die Evipan-Natrium-Narkose (Riforma med. 1934, Heft 4).
- Castro, E. P.: Die Evipan-Narkose in der Urologie (Diff. Santander 1934).
- Cipollino, O.: Über Pernocton und Evipan-Natrium als Basis-Narkose (Riforma med. 1934, H. 2).
- Daners, H.: Unsere Erfahrungen mit Evipan- und Eunarcon-Narkosen (Zbl. Gyn. 1935 Nr. 30).
- Decker, R.: Evipan-Natrium zur intravenösen Vollnarkose. (Münch. med. Wschr. 1934 Nr. 11 u. Md. Klin. 1934 Nr. 11).
- Deinhardt, D.: Evipannatrium, ein neues intravenöses Kurz- und Basis-Narkotikum. (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 3 und 1933 Nr. 48 u. Mfchr Geburtsh. 94, H. 1).
- Dietel: Geburtshilflicher Dämmer Schlaf durch rektale Anwendung von Evipan (Zbl. Gyn. 1935 Nr. 41).
- Doerfler: Erfahrungen mit der Evipan- bzw. Endorm-Narkose bei gynäk. und geburtshilf. Fällen im Krankenhaus u. in der Allgemeinpraxis (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 46).

- Ernst, M.: Evipan-Natrium, ein neues Mittel zur intravenösen Allgemeinnarkose (Münch. med. Wschr. 1933 Nr. 4).
- Els, H.: Evipan-Natriumrausch und Avertin-Narkose, eine ideale gegenseitige Ergänzung (Dtsch. med. Wschr. 1933 Nr. 18).
- Eisch: Ausprache (Zbl. Gyn. 1934, Nr. 7).
- Feldweg, P.: Bei Asthma kein Evipan (Münch. med. Wschr. 1934, Nr. 7).
- Frigyessi, J.: Vereinfachung der Lokalanästhesie bei gynäkol. Laparotomie durch Zwischenschaltung einer kurzen Evipan-Narkose (Zbl. Gyn. 1934, Nr. 21).
- Fuchs: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 33).
- Fuge, E.: Die Beeinflussung des Estercholesterins durch Lumbalanästhesie, Ätherchloroformnarkose und Evipan (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 10).
- Geiger, H.: Erfahrungen mit Evipan-Dauernarkosen (Zbl. Chir. 1935 Nr. 38).
- Gironcoli: Über die Evipan-Narkose (Riforma med. 1933 H. 44).
- Gocke, H.: Ein Beitrag zur Evipan-Natrium-Narkose (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 31).
- Gromelski, E.: Schmerzlose Entbindung durch Evipan-Natrium (Zbl. Gyn. 1936 Nr. 28).
- Harms, K.: Über die Dosierung des Evipan-Natriums zur Erzielung des Rausches und der Kurz-Narkose. (Dtsch. Ztg. f. Chir. 1934, 241, 721).
- Harttung: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- Herbst, R.: Die Evipan-Narkose in der Urologie (Zbl. Urol. 1934 H. 10).
- Holmann u. Mathieu: Intravenöse Narkosen mit Evipan (Amer. J. Obstetr. 1935 Nr. 30).
- Holtermann, C.: Klinische Erfahrungen mit der intravenösen Evipan-Natrium-Narkose i. d. Gyn. und Geburtshilfe (Dtsch. med. Wschr. 1933 Nr. 2).
- Über klinische Evipan-Natrium-Anwendung zur Schmerzlinderung der Spontangeburt (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 15).
 - Besteht eine wesentliche Gefährdung bei Anwendung der Evipan-Natrium-Narkose in der Geburtshilfe? (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 5).
 - Ausprache (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- Honcamp, O.: Unsere Erfahrungen mit Evipan-Natrium (Med. Klin. 1933 Nr. 32).
- Jannelli, G.: Zur Evipan-Natrium-Narkose (Riforma med. 1934 H. 12).
- Jaschke, R. Th. v.: Ausprache (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- Kamniker, K. und Rintelen, G.: Erfahrungen mit Evipan bei größeren Eingriffen (Dtsch. Z. Chir. 1935, 244, 571).
- Kayser: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- Kessler: Ausprache (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- Keufenhoff: Der heutige Stand der Evipannarkose (Fortchr. Ther. 1935, Bd. 11, S. 705).

- Kirchner: Evipan-Natrium in der Lokalanästhesie (Zbl. Chir. 1935 Nr. 23).
- Kobel: Zur Indikation der Evipan-Natrium-Narkose (Dtsch. med. Wschr. 1933 Nr. 26).
- Köhler: Aufsprache (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- König, W.: Heilung einer vollständigen Atemlähmung bei Evipan (Zbl. Chir. 1935 Nr. 12).
- Köster, O.: Die Evipan-Natrium-Narkose und ihre Dosierung (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 26).
- Kraul: Aufsprache (Zbl. Gyn. 1933 (Nr. 44)).
- Küfner: Evipan in der Geburtshilfe und Gynäkologie (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- Schlußwort (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- Langsteiner, F.: Bedeutet die Evipan-Natrium-Narkose einen Fortschritt in der Gynäkologie und Geburtshilfe (Wien. med. Wschr. 1934).
- Liffard, E.: Evipan-Natrium in der Geburtshilfe und Gynäkologie (Münch. med. Wschr. 33 Nr. 12).
- Löwenstein: Diskussion (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 44).
- Meder, F.: Das Evipan in der frauenärztlichen Klinik und Außenpraxis (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 8).
- Metz: Förderung und Schmerzlinderung der Geburt durch Belladonna und Evipan (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 44).
- Schlußwort (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 44).
- v. Mikulicz-Radecki: Diskussion (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 33).
- Nordentoft, J.: Ein Todesfall bei Evipan-Natrium-Narkose (Zbl. Chir. 1935 Nr. 41).
- Nordmeyer: Schmerzstillung unter der Geburt (Zbl. Gyn. 1935 Nr. 41).
- Novak, M.: Die Evipan-Narkose in der Urologie (Riforma med. 1934 H. 28).
- Ohligmacher: Aufsprache (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- Ortali: Zur intravenösen Narkose (Riforma med. 1934, H. 2).
- Pohl: Aufsprache (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- Poliak, M.: Zur Evipan-Narkose (Riforma med. 1934 H. 41).
- Polichetti, E.: Zur Evipan-Natrium-Narkose (Riforma med. 1934 H. 9).
- Radotzki, O.: Unsere Erfahrungen mit Evipan als steuerbarer Narkose (Therap. Gegenw. 7. H. 4).
- Recchioni, M.: Neue Gesichtspunkte zur Evipan-Narkose (Boll. Soc. Piemont. Chir. 1935, 5, H. 10 und Riforma med. 1935 H. 39).
- Redmann, C.: Ein Narkosezwischenfall bei Anwendung von Evipan (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- Rienhoff, Th.: Klinische Beobachtungen bei 500 intravenösen Evipan-Natrium-Narkosen (Inaug.-Diss. Köln 1933).

- R o s t o c k, P.: Evipan-Natrium-Narkose in der Unfall-Chirurgie. (Mfchr. f. Unfallheilk. 1934 Nr. 1 u. Zbl. Gyn. 1933 Nr. 34).
- R ü d e r: Ausprache (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- S a m u e l, M.: Evipan-Natrium zur schmerzlosen Geburt, sowie zur Narkose in der Gyn. für Praxis und Klinik (Dtsch. med. Wfchr. 1933 Nr. 2 u. Nr. 8).
- S a i l e r, K.: Die bei der Evipan-Narkose erworbenen Erfahrungen (Gyógyászat 1934, 24).
- S e l l h e i m: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- S c h e f f z e c k: Diskussion (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 44).
- S c h e h l: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 46).
- S c h u l z: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- S c h u m a c h e r, P. u. A d l e r, E.: Die intravenöse Evipan-Natrium-Narkose in der Gynäkologie (Klin. Wfchr. 1933, 976/978).
- S c h w a b: Ausprache (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- S p e c h t, K.: Über Endornarkose (Münch. med. Wfchr. 1933).
- R a u f c h-, K u r z- und Einleitungsnarkose mit Evipan-Natrium (Zbl. Chir. 1933, 242).
- S t e f a n: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- S t e p h a n: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 7).
- S t a m m: Evipan-Natrium (Bayer, I. G. Farbenindustrie A.G., Leverkusen).
- S t i m p f l, A.: Ist die intravenöse Evipan-Natrium-Narkose ungefährlich? (Münch. med. Wfchr. 1933 Nr. 37).
- S t o r m, C. J.: Untersuchungen über die Evipan-Natriumnarkose bei Affen (Klin. Wfchr. 1935 Nr. 14).
- T r a u b e: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 44).
- V a l e n c i, A.: Über die Evipan-Narkose (Clin. ostetr. 1934 H. 11).
- V a s e k, V.: Über die Anwendung des Evipan-Natriums in der Geburtshilfe und Gynäkologie (Therapeut. zprávy 1935, 6, 1).
- V o g t, E.: Erfahrungen mit Evipan-Natrium in der Gynäkologie und Geburtshilfe (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 44).
- S c h l u ß w o r t (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 44).
- E r f a h r u n g e n m i t E v i p a n - N a t r i u m (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- S c h l u ß w o r t (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 48).
- E r f a h r u n g e n m i t E v i p a n - N a t r i u m (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- S c h l u ß w o r t (Zbl. Gyn. 1934 Nr. 7).
- W e b e r, E.: Evipan-Natrium in der Geburtshilfe und Gynäkologie (Ref. franc. Gynéc. 1934 Nr. 29).
- W e e f e, H.: Pharmakologie des intravenösen Kurznarkotikums Evipan-Natrium (Dtsch. med. Wfchr. 1933 Nr. 2).
- W l a d i k a, W.: Ausprache (Zbl. Gyn. 1933 Nr. 33).
- d e Z e n o, G.: Zur Evipan-Narkose (Riforma med. 1934 H. 28).

Lebenslauf.

Am 5. November 1905 wurde ich zu Bonn a. Rh. als Sohn des Großkaufmanns Ernst R e m p e , und seiner Ehefrau Katharina geb. Rings, geboren. Ich bestand Ostern 1926 die Reifeprüfung am Städt. Gymnasium in Bonn, wobei ich von der mündlichen Prüfung befreit wurde. Ich widmete mich dann dem Studium der Medizin in Bonn und Tübingen. Nach Ablegung der ärztlichen Vorprüfung in Bonn bestand ich nach einem Studium von 11 Semestern mein ärztliches Staatsexamen am 20. Februar 1932 in Bonn mit dem Prädikat „gut“. Bis zum 1. September 1932 arbeitete ich hierauf an der Med. Universitätsklinik Bonn; vom 1. September 1932 bis 17. April 1933 befand ich mich als Medizinalpraktikant und späterer Volontärassistent an der Universitäts-Frauenklinik in Bonn. Vom 18. April 1933 bis zum 1. Oktober 1936 befand ich mich als Assistenzarzt am Kreiskrankenhaus Lübben (Spreewald) und beabsichtige, mich im November 1936 in Leverkusen-Wiesdorf als praktischer Arzt und Geburtshelfer niederzulassen. Die Approbation als Arzt besitze ich seit dem 21. Februar 1933.
